



Behandeling met Xolair

Longgeneeskunde

U krijgt binnenkort een behandeling met Xolair.

Het doel van de behandeling met het medicijn Xolair®, ook wel omalizumab genoemd, is het onder controle houden van symptomen bij patiënten die een ernstige allergische astma hebben.

De longarts heeft u ongetwijfeld al de nodige informatie gegeven over de behandeling met Xolair. In deze brochure kunt u de belangrijkste zaken nog eens rustig nalezen.

Het gaat hier om algemene informatie: omstandigheden en ervaringen kunnen van patiënt tot patiënt verschillen.

In deze brochure kunt u lezen hoe u zich voorbereidt, wat de behandeling inhoudt en wat nadien nog van belang kan zijn.

Waarom wordt U behandeld?

U heeft last van astma met benauwdheidsklachten. De behandeling met luchtwegverwijders en ontstekingsremmers zorgen niet voor voldoende vermindering van uw klachten.

Klachten, bijvoorbeeld benauwdheid, bij astma kunnen het gevolg zijn van stoffen waar u allergisch voor bent. De longarts kan bij ernstig astma Xolair voorschrijven wanneer is bewezen dat uw astma ontstaat door een allergische reactie en die onvoldoende reageert op de gebruikelijke medicijn/ inhalatie.

Xolair vermindert de kans dat de luchtwegen samentrekken bij een allergische reactie. Voordat u behandeld wordt met Xolair, zal de arts bloed laten prikken bij u, zodat hij aan de hand van de bloedsuikerspiegel en uw lichaamsgewicht kan bepalen hoeveel Xolair u nodig hebt.

U komt voor een Xolair behandeling en dan?

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

- Uw afsprakenkaart
- Uw identiteitsbewijs
- Een lijst van medicatie die u regelmatig slikt
- Iets om te lezen of te puzzelen of een MP3-speler, voor als u tussentijds moet wachten/ tijdens uw verblijf op de poli.
- Naam en gegevens van een contactpersoon die we zonodig kunnen bellen.

Waar meldt u zich?

- U kunt zich melden bij de balie van poli 70, Longgeneeskunde

Als u door dringende redenen verhinderd bent, geeft u dit dan zo snel mogelijk telefonisch door via het nummer 0229-257822

Hoe bereidt U zich voor op de behandeling?

U hoeft geen voorbereidingen te treffen voor deze behandeling. Als u medicijnen gebruikt, dan kunt u die voor, tijdens en na de behandeling gewoon blijven gebruiken.

Dit heeft geen invloed op de behandeling met Xolair

Eten/ drinken

Voor de behandeling mag u gewoon eten en drinken.

Meld het de doktersassistente die Xolair toedient als:

- U zwanger bent

Vervoer terugreis

Als u nergens last van hebt, mag u zelf auto rijden of machines bedienen.

Xolair kan duizeligheid, slaperigheid en flauwte veroorzaken, hoewel dit ongewoon is.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

Hoe en door wie wordt Xolair toegediend?

Xolair wordt gegeven door middel van een injectie vlak onder de huid die uitsluitend in de bovenarm of in het dijbeen gespoten wordt. Er kunnen meerdere injecties gegeven worden.

De doktersassistente van de longpolikliniek zal u de injectie geven.

Voordat u de injectie krijgt wordt u bloeddruk en pols gemeten.

Nadat u de injecties heeft gehad, zal de doktersassistente uw zuurstof, temperatuur en pols frequent blijven meten. Als alles goed verloopt, mag u na ongeveer 1,5 uur naar huis.

Hoeveel injecties krijgt u?

De injecties zullen elke twee of vier weken worden toegediend.

Uw behandelend arts bepaalt hoelang u met de behandeling door moet gaan.

Wat als er een dosis Xolair wordt gemist?

Neem contact op met de doktersassistente om een nieuwe afspraak te maken.

Wat als u stopt met de behandeling met Xolair?

Door onderbreking of beëindiging van de behandeling met Xolair kunnen uw astmasymptomen terugkomen.

Mogelijke bijwerkingen van behandeling met Xolair volgens de bijsluiter.

Plotselinge allergische reacties? Licht uw arts of de doktersassistente onmiddellijke in als u plotseling tekenen van allergie opmerkt, zoals uitslag, jeuk of netelroos op de huid, zwelling van het gezicht, de lippen, tong of andere lichaamsdelen, snelle hartslag, duizeligheid en lichtheid in het hoofd, kortademigheid, piepende ademhaling of moeite met ademen of enig andere nieuwe symptomen.

Andere bijwerkingen zijn reacties zoals pijn, roodheid, zwellingen jeuk rondom de injectieplaats. Ook is hoofdpijn een veel voorkomende bijwerking. De bijwerkingen zijn veelal mild of matig van aard.

Licht de doktersassistente in als u één van de bovenstaande bijwerkingen ervaart.

Wie kunt u bellen als u thuis bent en er is iets mis?

Maakt u zich zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van de behandeling kunt u altijd contact opnemen.

Bij de volgende klachten dient u altijd contact op te nemen:

Duizeligheid, gevoel van flauw vallen, acute ademhalingsproblemen, jeuk en uitslag.

- Na uw behandeling met Xolair kunt u bellen naar het Dijklander Ziekenhuis 0229-257257
- Vraagt u tijdens kantooruren naar de longpoli, waar uw behandeling plaatsvond.
- Vraagt u buiten kantooruren naar de Spoedeisende Hulp.

Vragen

Heeft u voor, tijdens of achteraf vragen over uw behandeling, stelt u deze dan aan de longarts of aan de doktersassistente. U kunt hieronder eventueel uw vragen noteren.

1.?

2.?

3.?

4.?

5.?

6.?

Telefoonnummers

U kunt het ziekenhuis bereiken via het algemene telefoonnummer: 0229-257257.

Als u een afspraak wilt maken of verzetten in verband met uw Xolair behandeling belt u met het afsprakennummer: 0229-257822

Notities:

[illegible]

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00588-NL 09-12-2020