Bronchoscopie

Longgeneeskunde

DIJKLANDER ZIEKENHUIS

Bronchoscopie

Zoals besproken met uw behandelend arts heeft u een bronchoscopie bij het scopiecentrum van het Dijklander Ziekenhuis.

U wordt verwacht voor een bronchoscopie

Op:_____ dag

Datum: _____

Om: _____ uur

U mag zich melden in de hal van het ziekenhuis.
Indien u wilt wordt u door de gastvrouw/heer naar het scopiecentrum gebracht.

- Het scopiecentrum Hoorn bevindt zich op de **6e etage, lift R**
  u heeft **geen** afsprakenticket nodig.

- Het scopiecentrum Purmerend bevindt zich op de **1e etage, route 75A**
  u heeft een afsprakenticket nodig.

Wat is een bronchoscopie

Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij de longarts met een bronchoscoop in uw luchtwegen (bronchiën) kijkt. Een bronchoscoop is een kijkinstrument, een dunne buigzame slang met een videocamera waarmee de luchtwegen worden onderzocht. Bovendien kunnen via dit kijkinstrument zonodig kleine stukjes weefsel worden weggenomen.

Het onderzoek wordt niet altijd uitgevoerd door de arts die het onderzoek met u heeft afgesproken.
De duur van het onderzoek is ongeveer 10 tot 30 minuten.

De voorbereiding thuis

Onderzoek in de ochtend
Voor het onderzoek: **na 24 uur (12 uur) 's nachts mag u niet meer eten**.

Onderzoek in de middag
Voor het onderzoek: 's morgens mag u **tussen 06.00 uur en 07.00 uur een licht ontbijt.**
Dit mag een beschuit of witbrood zijn zonder boter, met jam.
Geen vette maaltijd zoals pap, vla of yoghurt.

- Medicijnen mag u blijven gebruiken en tot **2 uur voor de onderzoektijd** mag u maximaal 2 bekers water drinken.
- Wanneer u **bloedverdunnende medicatie** gebruikt, geeft uw behandelend arts aan of en wanneer u deze moet stoppen.
- Als u inhalatiemedicatie gebruikt dan moet u deze op de dag van het onderzoek gebruiken.

Op de behandelkamer

- Het is verstandig geen knellende kleding te dragen.
- Als u een bril draagt neemt u dan een brillenkoker mee voor de veiligheid van uw bril.
- Als u een gebitsprothese heeft en een gebittenbakje heeft neemt u deze dan mee.

Voordat het onderzoek begint volgt er een standaard procedure, de "time-out" procedure.
Bent u de juiste patiënt? Om daar zeker van te zijn stellen wij u een aantal vragen: naam, geboortedatum, wat voor onderzoek u krijgt en of u ergens allergisch voor bent.
Indien u een gebitsprothese heeft wordt u gevraagd deze uit te doen en eventueel de bril af te nemen.
Uw keel en mond worden enkele malen verdooft met een verdovingsspray.
Dit is nodig om het kokhalsreflex weg te nemen. De verdovingsspray heeft de smaak van een overrijpe banaan en geeft u een gevoelloze keel. Het slikken gaat nu
moeilijker. Er wordt nog een verdovingsvloeistof in de luchtwegen gedruppeld. Dit kan een hoestprikkel veroorzaken die na enige seconden weer verdwijnt.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek kunt u gewoon doorademen. Via een lampje aan het eind van de scoop kan de arts de binnenkant van de luchtpijp en de vertakkingen ervan bekijken. Soms wordt via dezelfde slang wat slijm weggezogen en/of een klein stukje weefsel (een biopt) weggenomen voor microscopisch onderzoek. Soms vindt de arts het noodzakelijk dat de luchtwegen worden gespoeld (lavage). Een water-zout oplossing wordt dan via de scoop ingespoten die meteen weer wordt afgezogen. Het afgezogen vocht en eventueel weggenomen stukje weefsel worden op het laboratorium onderzocht. Het spoelen van de luchtwegen en het nemen van een biopt zijn pijnloos.

De nazorg

Het is verstandig een begeleider mee te nemen en dat u tot 2 uur na het onderzoek niet eet en niet drinkt.

De verdoving in de keel is dan nog niet uitgewerkt en u zou zich daardoor kunnen verslikken of de keel verbranden bij hete dranken. Begin met een slokje water. Als u zich niet verslikt mag u weer alles hebben. Het kan zijn dat u een tijdje een geïrriteerd gevoel in uw keel hebt en wat moeilijk slikt. Ook kan het zijn dat u na het onderzoek wat bloederig slijm ophoest. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken, het verdwijnt vanzelf weer, binnen 1 tot 2 dagen. Als uw luchtwegen gespoeld zijn (lavage) kan het zijn dat u 's avonds koorts krijgt of een pijnlijk gevoel bij het ademhalen. Dit is een normaal verschijnsel. U kunt zonodig een Paracetamol innemen. Als het de volgende dag nog niet over is neem dan contact op met uw longarts. Als er stukjes weefsel via de bronchoscoop weggenomen worden is er geringe kans op directe complicaties (zoals bloedingen) die in het algemeen niet ernstig zijn en vanzelf weer overgaan.

Als u naar huis gaat krijgt u een nazorgformulier mee met de voorlopige uitslag van het onderzoek en nazorginformatie.

Tot slot

Deze informatie is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u van uw arts heeft ontvangen. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig na te lezen.
Heeft u nog vragen over dit onderzoek, schrijft u ze dan op en neem contact op met het scopiecentrum 0229-257281.
Met algemene vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist die ook de uitslag van het onderzoek aan u zal meedelen en bespreken.

Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn
Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl

FLD-00553-NL 04-12-2025

DIJKLANDER ZIEKENHUIS