Bronchoscopie onder sedatie

Longgeneeskunde

DIJKLANDER ZIEKENHUIS

Bronchoscopie onder sedatie

Zoals besproken met uw behandelend arts krijgt u een bronchoscopie bij het scopiecentrum van het Dijklander Ziekenhuis.

U wordt verwacht voor een bronchoscopie

Op:_____ dag

Datum: _____

Opnametijd: _____ uur

Aanvang onderzoek:_____uur

U mag zich melden in de hal van het ziekenhuis.
U wordt door de gastvrouw/heer naar het scopiecentrum gebracht.

- Het scopiecentrum Hoorn bevindt zich op de **6e etage, lift R,** u heeft **geen** afsprakenticket nodig.
- Het scopiecentrum Purmerend bevindt zich op de **1e etage, route 75A,** u heeft een afsprakenticket nodig.

Voor het onderzoek wordt u enige uren opgenomen.
Voor uw eigen rust, de privacy van andere patiënten en de bewaking van patiënten tijdens de opname geldt de regel dat er geen familie/begeleiding aanwezig is op de opname/uitslaapkamer.

Wat is een bronchoscopie

Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij de longarts met een bronchoscoop in uw luchtwegen (bronchiën) kijkt. Een bronchoscoop is een kijkinstrument, een dunne buigzame slang met een videocamera waarmee de luchtwegen worden onderzocht. Bovendien kunnen via dit kijkinstrument zonodig kleine stukjes weefsel worden weggenomen.

Het onderzoek wordt niet altijd uitgevoerd door de arts die het onderzoek met u heeft afgesproken.
De duur van het onderzoek is ongeveer 30 minuten.

De bronchosopie vindt plaats onder sedatie (een kalmeringsmiddel)

Belangrijk!

Omdat de sedatie ook sufheid veroorzaakt, mag u tot de volgende ochtend 06.00 uur niet zelf autorijden en ook niet zelfstandig met het openbaar vervoer of met de taxi reizen. U bent niet verzekerd bij het veroorzaken van een ongeval als u onder invloed bent van een slaapmiddel. U moet dus voor begeleiding en vervoer naar huis zorgen. **Als u géén vervoer naar huis regelt kan het onderzoek** met **sedatie** niet **doorgaan!** Het is van belang dat uw begeleiding u ophaalt van de afdeling waar u ligt opgenomen. Het wordt op de dag van de sedatie afgeraden om alcohol te drinken en neem geen belangrijke en/of ingrijpende beslissingen. U kunt niet aan het werk of sporten de rest van de dag.

De voorbereiding thuis

Medicijnen mag u blijven gebruiken en t*ot 2 uur voor de opnametijd* mag u *maximaal 2 bekers water drinken*.
Wanneer u **bloedverdunnende medicatie** gebruikt, geeft uw behandelend arts aan of en wanneer u deze moet stoppen.
Als u inhalatiemedicatie gebruikt dan moet u deze op de dag van het onderzoek gebruiken.

Onderzoek in de ochtend
De avond voor het onderzoek: na **24 uur (12 uur) 's nachts mag u niet meer eten.**

Onderzoek in de middag
In de ochtend mag u **tussen 06.00 uur en 07.00 uur een licht ontbijt**.
Dit mag een beschuit of witbrood zijn zonder boter, met jam.
Geen vette maaltijd zoals pap, vla of yoghurt.

Opname

Gedurende de opname dient u **geen**

- knellende kleding te dragen maar een **T-shirt met korte mouwen,**
- lippenstift, ringen, andere sieraden of piercing te dragen,
- bodylotion te gebruiken,
- kauwgom in de mond te hebben,
- waardevolle spullen mee te nemen.

- Als u een bril draagt neemt u dan een brillenkoker mee voor de veiligheid van uw bril.
- Als u een gebitsprothese heeft en een gebittenbakje heeft neemt u deze dan mee.

Bij de opname wordt er een infuusnaaldje geplaatst. Enige tijd na de opname wordt u naar de Endoscopiekamer gebracht voor het onderzoek.

Op de behandelkamer

Voordat het onderzoek begint volgt er een standaard procedure, de “time-out” procedure.
Bent u de juiste patiënt? Om daar zeker van te zijn stellen wij u een aantal vragen: naam, geboortedatum, wat voor onderzoek u krijgt en of u ergens allergisch voor bent.

Indien u een gebitsprothese heeft wordt u gevraagd deze uit te doen en eventueel de bril af te nemen.
Uw keel en mond worden enkele malen verdoofd met een verdovingsspray. Dit is nodig om het kokhalsreflex weg te nemen. De verdovingsspray heeft de smaak van een overrijpe banaan en geeft u een gevoelloze keel. Het slikken gaat nu moeilijker. Er wordt nog een verdovingsvloeistof in de luchtwegen gedruppeld. Dit kan een hoestprikkel veroorzaken die na enige seconden weer verdwijnt. Vervolgens wordt er via het infuusnaaldje medicatie gegeven waardoor het bewustzijn wordt verlaagd.

Tijdens het onderzoek kunt u gewoon doorademen. Via een lampje aan het eind van de scoop kan de arts de binnenkant van de luchtpijp en de vertakkingen ervan bekijken. Soms wordt via dezelfde slang wat slijm weggezogen en/of een klein stukje weefsel (een biopt) weggenomen voor microscopisch onderzoek. Soms vindt de arts het noodzakelijk dat de luchtwegen worden gespoeld (lavage). Een water-zout oplossing wordt dan via de scoop ingespoten die meteen weer wordt afgezogen. Het afgezogen vocht en eventueel weggenomen stukje weefsel worden op het laboratorium onderzocht. Het spoelen van de luchtwegen en het nemen van een biopt zijn pijnloos.

De nazorg

Als het onderzoek is afgelopen wordt u teruggebracht naar de uitslaapkamer van het scopiecentrum. U verlaat het ziekenhuis gemiddeld 1 uur na het onderzoek. Het is belangrijk dat u tot 1½ uur na het onderzoek niet eet en/of drinkt. De verdoving in de keel is dan nog niet uitgewerkt en u zou zich daardoor kunnen verslikken. Begin met een slokje water. Als u zich niet verslikt mag u weer alles hebben. Het kan zijn dat u een tijdje een geïrriteerd gevoel in uw keel hebt en wat moeilijk slikt.

Ook kan het zijn dat u na het onderzoek wat bloederig slijm ophoest. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken, het verdwijnt vanzelf weer, binnen 1 tot 2 dagen. Als uw luchtwegen gespoeld zijn (lavage) kan het zijn dat u 's avonds koorts krijgt, of een pijnlijk gevoel bij het ademhalen. Dit is een normaal verschijnsel. U kunt zonodig een Paracetamol innemen. Als het de volgende dag nog niet over is, neem dan contact op met uw longarts. Als er stukjes weefsel via de bronchoscoop weggenomen worden, is er geringe kans op directe complicaties (zoals bloedingen) die in het algemeen niet ernstig zijn en vanzelf weer overgaan.

Wanneer u weer naar huis gaat krijgt u een nazorgformulier mee met de voorlopige uitslag van het onderzoek en nazorginformatie.

Deze informatie is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u van uw arts heeft ontvangen. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig na te lezen. Heeft u nog vragen over dit onderzoek, schrijft u ze dan op en neem contact op met het scopiecentrum, telefoon 0229-257281 of kijk op de website: www.dijklander.nl
Met algemene vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist, die ook de uitslag van het onderzoek aan u zal meedelen en bespreken.

Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn
Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl

FLD-00558-NL 10-01-2023

DIJKLANDER ZIEKENHUIS