



Coeliacusblokkade


Pijnbestrijding

Coeliacusblokkade

Deze folder is bestemd voor patiënten die in aanmerking komen voor een Plexus Coeliacus blokkade.

Inleiding

Deze behandeling kan worden toegepast bij ernstige pijnklachten ten gevolge van kanker van de bovenbuik organen zoals de alvleesklier, de maag en de lever. Het betreft een blokkade van een zenuwnetwerk in de bovenbuik. Dit zenuwnetwerk wordt in medische termen Plexus Coeliacus genoemd. Bij de meerderheid van de patiënten treedt na de blokkade een goede pijnvermindering op. De behandeling kan in dagopname worden uitgevoerd, of tijdens een korte opname.



Plexus Coeliacus blokkade

De behandeling kan in principe onder plaatselijke verdoving plaatsvinden. De keuze kan in overleg met de pijnspecialist gemaakt worden. U krijgt van tevoren een infuus en wordt aan de bewaking aangesloten. De behandeling duurt ongeveer 1/2 tot 1 uur. Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. Onder röntgendoorlichting worden 2 naalden via de rug ingebracht. Er wordt een contrastvloeistof ingespoten om de positie van de 2 naalden te controleren. Vervolgens wordt de behandelvloeistof rondom het zenuwnetwerk gespoten.

Bijwerkingen/ complicaties

- Diarree is een vaak voorkomende bijwerking en kan enkele dagen aanhouden.
- In zeldzame gevallen treedt er een bloeddrukdaling op die goed is te behandelen. U kunt dan ook in de eerste weken na de behandeling wat duizelig worden als u plotseling rechtop komt.
- In uiterst zeldzame gevallen kan er een dwarslaesie met gedeeltelijke of gehele verlamming van beide benen optreden.

Resultaat

Het resultaat van de blokkade is pas 1 of 2 dagen na de behandeling duidelijk. Bij de meerderheid van de patiënten treedt na de blokkade een goede pijnvermindering op. Het effect van de behandeling houdt gemiddeld enkele maanden aan en kan zonodig herhaald worden. In een aantal gevallen zal een aanvullende behandeling nodig zijn.

Let op!

- Indien u antistollingsmiddelen (bloedverduunners) gebruikt, dient het gebruik hiervan in overleg met de pijnspecialist enkele dagen voor de ingreep gestopt te worden.
- Indien u bekend bent met een allergie voor röntgencontrastvloeistof dient u dit bekend te maken.

Vragen

Bij vragen kunt u contact opnemen met poli pijnbestrijding;

Poli Pijnbestrijding **Volendam:**

telefoonnummer (0229)257505

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 11.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

Poli Pijnbestrijding **Hoorn:**

telefoonnummer (0229)257646,

Maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.45 uur

Email: pijnpoli@dijklander.nl

Per e-consult via: mijndijklander.nl

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00165-NL 08-01-2025