Eierstokkanker keuzekaart

U heeft gehoord dat u **hoog stadium eierstokkanker** heeft. Deze keuzekaart kan u en uw dokter helpen om de mogelijkheden te bespreken.

Anti-kanker behandeling

De standaard anti-kanker behandeling voor eierstokkanker is een combinatie van een operatie en chemotherapie.

Operatie

Met de operatie wordt zoveel mogelijk zichtbare ziekte uit uw buik gehaald. Dit gebeurt via een snee in uw buik.

Chemotherapie

Chemotherapie zijn medicijnen die zorgen dat kankercellen worden gedood en uitbreiding van de ziekte wordt geremd.

Welke volgorde?

Of u eerst een operatie krijgt en daarna de chemotherapie of andersom, hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw dokter geeft aan wat uw mogelijkheden zijn.

Mogelijkheden	Starten met operatie	Starten met chemotherapie	Behandeling van klachten, geen anti-kanker behandeling
Wat houdt de behandeling in?			De behandeling is gericht op het verminderen van uw klachten. De ziekte breidt zich ondertussen uit.
Wanneer komt u ervoor in aanmerking?	Als uw behandelteam denkt dat de kans groot is dat alle zichtbare ziekte kan worden weggehaald. Pas tijdens de operatie wordt duidelijk hoeveel ziekte weggehaald kan worden.	Als uw behandelteam inschat dat niet alle zichtbare ziekte weggehaald kan worden in een operatie. Of als de operatie voor u nu te zwaar is. Na 3 kuren beoordeelt uw behandelteam of u geopereerd kan worden.	U kunt ervoor kiezen om u alleen te laten behandelen tegen uw klachten. Bijvoorbeeld als de anti-kanker behandeling te zwaar is.
Wat zijn de voor- en nadelen?	• Als alle ziekte kan worden weggehaald geeft dit mogelijk een langere overleving • Risico op tweede operatie als ziekte niet kan worden weggehaald • Verhoogd risico op complicaties na operatie • Verhoogd risico op darmoperatie en stoma	• Verlaagd risico op complicaties na operatie • Verlaagd risico op stoma	• Geen last van bijwerkingen van anti-kanker behandeling • Effect van de behandeling is vaak tijdelijk • Uw conditie wordt steeds slechter
Welke aanvullende behandeling is er nog meer?	Sommige vrouwen komen in aanmerking voor chemotherapie via de buikholte. Dit geeft een langere overleving. Het zijn zware behandelingen met extra bijwerkingen. Bespreek met uw behandelteam of u hiervoor in aanmerking komt en wat u daarbij belangrijk vindt. IP chemotherapie wordt via een buikkatheter direct in de buikholte toegediend. U krijgt dit in combinatie met de chemokuren via infuus.	Bij HIPEC wordt de buikholte 1,5 uur gespoeld met verwarmde chemotherapie aan het einde van de operatie.	
Wat is uw levens-verwachting?	Na een anti-kankerbehandeling keert bij een groot aantal vrouwen de ziekte toch weer terug. Vooraf is moeilijk te zeggen bij wie dat gebeurt en wanneer. Soms is dat al na enkele maanden, maar meestal binnen 5 jaar. Genezen kan dan niet meer. Er zijn meestal nog wel levensverlengende behandelingen mogelijk.		Uw levensverwachting is enkele maanden.

olijf nvog V&VN ZorgKeuzeLab

Versie: apr 2019