



Endocarditis

Cardiologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Wat is endocarditis

Endocarditis is een ontsteking van het endocard, dit betekent de binnenwand van de verschillende ruimten in het hart waaronder de boezems, kamers en de hartkleppen vallen.

Bij ieder mens komen regelmatig bacteriën in de bloedbaan vanuit wondjes en ontstekingen. In een gezond lichaam worden kleine hoeveelheden bacteriën meteen onschadelijk gemaakt. In een lichaam dat minder gezond is, hebben bacteriën meer kans om te overleven. Via de bloedbaan kunnen ze in het hart terechtkomen en zich nestelen op de binnenbekleding van het hart (het endocard) en de kleppen.

De infectieziekte die dan ontstaat, heet endocarditis.

Verschijselen

Er zijn diverse verschijnselen die kunnen optreden als u bacteriële endocarditis hebt. Deze verschijnselen kunnen echter ook wijzen op een andere ziekte of aandoening.

Mogelijke verschijnselen zijn:

- koorts, (koude) rillingen;
- (nachtelijk) zweten;
- hoofdpijn;
- * pijn op de borst
 - kleplekkage
 - hartfalen
 - ritmestoornissen
 - versnelde hartslag;
- vermoeidheid;
- kortademigheid;
- gewichtsverlies;
- bloedarmoede;
- gewrichtspijn;
- puntvormige bloedinkjes, bijvoorbeeld onder de nagels

Gevolgen

Door de ontsteking kunnen de hartkleppen beschadigd raken of zelfs helemaal kapot gaan. Hierbij vervormen de kleppen en sluiten ze niet goed meer: dit heet klepinsufficiëntie. Als de hartkleppen ernstig beschadigd raken kan het hart het bloed niet meer goed genoeg rondpompen: dit heet hartfalen. Verder kan de bacterie zich via de bloedbaan verspreiden naar andere organen, voornamelijk naar de hersenen (CVA), de longen en de milt.

Diagnose

De diagnose word gesteld op de medische voorgeschiedenis van de patiënt, lichamelijk onderzoek, bloedonderzoeken, longfoto's en echocardiografie. Gedurende uw opname zal u regelmatig onderzoeken krijgen om te kijken hoe het met de infectie is.

Behandeling

Wanneer er is vastgesteld dat u (waarschijnlijk) een bacteriële endocarditis heeft dan wordt u eerst met antibiotica behandeld. De bacterie die de ontsteking van de hartklep veroorzaakt, reageert alleen op antibiotica die direct in de bloedbaan wordt toegediend. Dit betekent dat de u gedurende 6 tot 8 weken antibiotica via het infuus krijgt om de ontsteking te kunnen genezen. In dit geval wordt er gekozen voor een infuus die in een groter bloedvat geplaatst wordt. Dit kan bijvoorbeeld onder het sleutelbeen zijn.

Operatie

Bij bacteriële endocarditis kunnen complicaties ontstaan zoals ernstige hartklepaandoeningen en hartfalen. In zo'n geval besluit de arts meestal tot een hartoperatie. Bij deze hartoperaties wordt de beschadigde klep bijna altijd vervangen.

Antibiotica profylaxe/voorzorgsmaatregelen

Het is van belang dat u voor elke ingreep (b.v bij de tandarts, chirurgische ingrepen) antibiotica gebruikt om te voorkomen dat er een bacterie het lichaam binnendringt. Hierover krijgt u advies van uw behandelend cardioloog.

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00202-NL 09-12-2020