



Verwijderen fibroadenoom

Vacuümexcisie fibroadenoom

Radiologie

U bent door uw behandelend arts naar de afdeling Radiologie en nucleaire geneeskunde verwezen om een fibroadenoom te laten verwijderen. Dit onderzoek wordt gedaan door een radioloog met behulp van meerder radiodiagnostisch laboranten. **Op het afgesproken tijdstip meldt u zich met uw verzekerings- en legitimatiebewijs op de afdeling Radiologie.**

Het onderzoek

Allereerst wordt het fibroadenoom opnieuw in beeld gebracht. De behandeling vindt plaats met behulp van echografie en een biopsienaald. De biopsienaald is verbonden met een vacuümsysteem. Hierbij wordt steriel gewerkt. Uw borst wordt gedesinfecteerd. Daarna krijgt u een plaatselijke verdoving. Vervolgens wordt via een minimaal sneetje in de huid de biopsienaald ingebracht. Het fibroadenoom wordt nu plakje voor plakje verwijderd door de biopsienaald met behulp van het vacuümsysteem. Dit apparaat maakt tijdens de gehele procedure een brommend geluid. Dit gebeurt net zo lang totdat het fibroadenoom niet of nauwelijks meer zichtbaar is. De kans bestaat dat er een bloeduitstorting ontstaat in het gebied waar het fibroadenoom verwijderd is. Het wondje wordt met hecht strips dichtgeplakt en verbonden. Eventueel wordt er een drukverband aangelegd.

De totale behandeling duurt ongeveer 60 tot 90 minuten.

Allergie

Wanneer u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde stoffen, wilt u ons dat dan vóór het onderzoek laten weten?

Vorbereiding:

We raden u aan een stevige (sport)bh en gemakkelijk zittende kleding te dragen, waarbij u uw bovenlichaam makkelijk kunt ontbloten. Wij vragen u voor het onderzoek geen bodylotion, crème, poeder of zinkzalf te gebruiken. U mag wel deodorant gebruiken. Het is verstandig om goed te eten voor de behandeling, zodat u niet flauw wordt. Wij adviseren u om 1 uur voor het onderzoek 2 paracetamol in te nemen, het afnemen van de biopten kan wat pijnlijk zijn.

Nazorg:

- Na het onderzoek wordt het wondje ongeveer 10 minuten afgedrukt en verbonden. U mag voor de pijn paracetamol (géén asprine of ibuprofen) gebruiken volgens de dosering in de bijsluiter. Blijft u langdurig pijn of een zwelling houden? Neem dan contact op met uw huisarts.
- Wij adviseren u tot 24 uur na het onderzoek een stevige (sport)bh te dragen (ook 's nachts).
- Tegen pijn en zwelling kunt u thuis een koud kompres op de borst houden.
- U mag na het onderzoek niet autorijden, het is daarom verstandig iemand mee te nemen.

Op tijd aanwezig:

Wij werken op afspraak en verzoeken u op tijd aanwezig te zijn. Helaas kan het zijn dat u bij een te late aankomst een nieuwe afspraak moet maken om vertragingen voor alle volgende patiënten te voorkomen.

Uitslag:

De radioloog beoordeelt de foto's en stuurt de uitslag door naar uw huisarts of specialist.

Contact:

Heeft u voor, tijdens of na het onderzoek vragen, stelt u ze dan gerust.

Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig doorgeven?

Op werkdagen zijn wij te bereiken van 08:00 tot 17:00

Hoorn: T 0229-257373

Hoorn en Purmerend: E Radiologie@dijklander.nl

Purmerend: T 0299-457535

Enkhuizen: T 0228-312345

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-01074-NL 14-09-2021