



# Gastroscopie

Scopiecentrum/Maag Darm Lever



## Gastroscopie

Op verzoek van uw behandelend arts hebben wij een afspraak voor u gemaakt.

### U wordt verwacht voor een gastroscopie

Op:----- dag

Datum: -----

Om: ----- uur

Onderzoektijd ----- uur

Voor locatie **Hoorn** mag u zich *melden bij de balie* van het scopiecentrum op de **6e etage met lift R.**

U heeft **geen** afsprakenticket nodig.

Voor locatie **Purmerend** mag u zich *melden bij de balie* van het scopiecentrum op de **1e etage, route 75A.**

U heeft een afsprakenticket nodig.

### Wat is een gastroscopie:

Bij een gastroscopie bekijkt de arts het slijmvlies van de slokdarm, de maag en het eerste deel van de twaalfvingerige darm, direct voorbij de maag. Dit is mogelijk met de gastroscop, een flexibele slang met een doorsnee van één centimeter met aan het eind een videocamera, die via de mond wordt ingebracht.

Een gastroscopie kan alleen goed uitgevoerd worden, wanneer de maag leeg is.

## Vorbereiding

### Bij een onderzoek in de ochtend

Op de avond voor het onderzoek:

- **Tot** 24.00 uur 's nachts mag u nog eten en drinken.
- **Vanaf** 24.00 uur 's nachts mag u tot 2 uur voor het onderzoek **maximaal** 2 bekers water drinken, niet meer eten.

## Vorbereiding

### Bij een onderzoek in de middag

Op de dag van het onderzoek:

- 06.00 uur in de ochtend, licht ontbijt, 1 sneetje witbrood of beschuit met jam zonder boter en 1 kop thee zonder suiker en zonder melk.  
Geen vette maaltijd zoals pap, vla en yoghurt.
- U mag gedurende de dag nog **maximaal** 2 bekers water drinken tot 2 uur voor het onderzoek.

U dient voor het onderzoek:

geen lippenstift of tongpiercing te dragen  
geen kauwgom in de mond te hebben.

Op de scopiekamer moet u een eventuele gebitsprothese of plaatje verwijderen.  
Als u een gebittenbakje heeft neemt u deze dan mee.

Tijdens het onderzoek is het niet toegestaan dat er begeleiding of familie op de scopiekamer aanwezig is.

## Het onderzoek:

Vooraf aan het onderzoek volgen er nog enkele standaardcontroles. Deze standaardcontrole heet de “time-out procedure”.

Er worden een aantal vragen gesteld: uw naam, geboortedatum, hoe laat heeft u voor het laatst gegeten/gedronken, heeft u een allergie, hart of longproblemen, gebruikt u bloedverdunners en weet u welk onderzoek u krijgt.

Voor het onderzoek start krijgt u een drankje te drinken om schuimvorming in de maag tegen te gaan.

Om een kokhalsreflex te voorkomen of te verminderen wordt uw keel verdoofd met een keelspray.

U neemt plaats op de behandelafel en gaat liggen op uw linkerzijde. Om de gastroscoop te beschermen wordt in uw mond een bijtring geplaatst met een bandje om uw nek om de bijtring te fixeren. De bijtring voorkomt dat de scoop wordt beschadigt door de tanden en/of kaken. De arts brengt nu de scoop door de bijtring naar de keel en vraagt dan om te slikken.

Hierdoor komt de gastroscoop gemakkelijk in de slokdarm. (De scoop komt niet in de luchtwegen terecht.)

Vanaf dit moment wordt de gastroscoop door de arts bestuurd.

Doordat de arts via de gastroscoop CO<sub>2</sub> in blaast ontplooiën de maag en twaalfvingerige darm zich en is het slijmvlies beter te bekijken. Hierdoor ontstaat vaak een opgezet gevoel in de bovenbuik en is er kans dat u lucht opboert. Dit is niet erg.

Het onderzoek duurt gemiddeld tien minuten. Indien nodig neemt de arts tijdens het onderzoek stukjes weefsel weg (biopten). Dit materiaal gaat voor onderzoek naar het laboratorium. Van het nemen van deze biopten merkt u niets.

Een gastroscopie is geen pijnlijk onderzoek. Het kan een wat onaangenaam gevoel zijn. Belangrijk is dat u rustig blijft doorademen. Er zijn twee verpleegkundigen bij die u hierbij begeleiden.

## Medicijnen:

Als u **maagzuurremmers** gebruikt (omeprazol, losec, pantozol, nexium, prezal, rantidine, cimetidine), kunt u deze blijven gebruiken tenzij in het voorgesprek anders is besproken. Op de dag van het onderzoek de maagzuurremmers pas **na** het onderzoek innemen!

Gebruikt u **ijzertabletten** dan is het noodzakelijk dat u hiermee **stopt** vanaf **zeven dagen** voor het onderzoek.

Overleg met uw behandelend arts of u met bepaalde medicijnen moet stoppen. Dit geldt voornamelijk voor de bloedverdünnende medicatie. Het gebruik van deze middelen tijdens het ondergaan van een gastroscopie, kan bij een ingreep langdurige bloedingen veroorzaken. Bloeddruk- en hartmedicatie en medicatie tegen epilepsie kunt u 's morgens met een slok water innemen.

-----

-----

-----

## Diabetes:

Heeft u diabetes en gebruikt u tabletten of insuline, neemt u hierover contact op met uw (huis)arts of diabetesverpleegkundige. Indien u insuline gebruikt controleer dan vóór dat u naar het ziekenhuis vertrekt uw bloedsuiker. Het is ook aan te raden uw insulinepen, bloedsuikermeter en een boterham mee te nemen voor na het onderzoek.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgevoegde folder.

## **Mogelijke risico's en complicaties:**

Hoewel een gastroscopie over het algemeen een veilig onderzoek is, kunnen er in enkel geval complicaties optreden.

Wanneer er nog voedsel in de maag aanwezig is, kan u zich tijdens de gastroscopie hierin verslikken. Als het voedsel in de luchtpijp komt, kan er een longontsteking optreden. Dit gebeurt vaker na het toedienen van keelverdooving of kalmeringsmiddelen. Krachtig opboeren tijdens het onderzoek kan een beschadiging in het laatste gedeelte van de slokdarm veroorzaken met een lichte bloeding tot gevolg. Wanneer de gastroscopie moeizaam de keel passeert of wanneer er vernauwingen zijn, kan er een scheurtje ontstaan. Deze complicaties komen niet vaak voor en zijn niet ernstig. Ze zijn meteen door de arts zichtbaar en direct te behandelen.

Na afloop kunt u een wat rauw gevoel in de keel ervaren, dit gevoel verdwijnt doorgaans vrij snel.

## Nazorg en uitslag:

U krijgt een formulier mee: “Nazorgformulier Scopiecentrum” met daarop informatie over het onderzoek, nazorgregels en/of afspraken.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de arts/huisarts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Dan is ook de uitslag van het eventueel afgenomen weefsel beschikbaar.

Als u keelverdooving heeft gekregen, mag u het eerste half uur na het onderzoek nog niet eten en drinken in verband met kans op verslikken.

Wanneer u **binnen 24** uur na gastroscopie klachten krijgt als toenemende buikpijn, bloedbraken of koorts krijgt, moet er contact worden opgenomen met het ziekenhuis.

Binnen kantooruren neemt u contact op met het scopiecentrum Hoorn, 0229-257281.

Buiten kantooruren kan men via de receptie van het ziekenhuis contact opnemen met de spoedeisende hulp van locatie Hoorn, 0229-257257.

Is het onderzoek **langer dan 24 uur** geleden en u krijgt klachten dan mag u contact opnemen met uw huisarts.

Uw huisarts beoordeeld dan of er contact opgenomen moet worden met het ziekenhuis.

## Wachttijd:

Uiteraard proberen wij u op het afgesproken tijdstip te helpen. Soms kan het gebeuren dat u toch langer moet wachten, door bijvoorbeeld een spoedingreep of onvoorziene omstandigheden. Wij vragen hiervoor uw begrip.



## **Bereikbaarheid**

### **locatie Hoorn:**

Met de auto via de provinciale weg (N506), u volgt de borden Dijklander Ziekenhuis. Bij het ziekenhuis is een parkeergarage waarvoor moet worden betaald (dagkaart). Het scopiecentrum bevindt zich op de **6e etage, lift R**.

### **Locatie Purmerend:**

Bij het ziekenhuis is een parkeerplaats aan de voorzijde en aan de achterzijde van het ziekenhuis waarvoor moet worden betaald. Het scopiecentrum bevindt zich op de **1e etage, route 75a**

**Openingstijden maandag t/m vrijdag  
van 08.00 uur tot 17.30 uur.**

**Telefonisch bereikbaar: 0229-257281 tot 17.00 uur.**

## **Maag Darm Leverartsen werkzaam in het Dijklander Ziekenhuis**

Dhr. drs.A.A. Karimbeg

Dhr. dr. J. Schmidt

Dhr. dr. E. Schnekenburger

Mw. drs. M.S.Vlug

Dhr. dr. X.G. Vos

Dhr. dr. S. Balkema

Mw. dr. M.S.G. Sikkens

Dhr. dr. F.W.J. te Braake

Mw. M.G.F. van Lier

Dhr. P.W. Weijenborg

Dhr. G. Nibourg

Dhr. B. Meijer

**Als u nog vragen heeft, stelt u ze dan gerust aan uw arts of aan de verpleegkundige van het scopiecentrum of kijk op onze website: [www.dijklander.nl](http://www.dijklander.nl)**



**Locatie Enkhuizen**

Molenweg 9b  
1601 SR Enkhuizen  
T. 0228 312 345

**Locatie Hoorn**

Maelsonstraat 3  
1624 NP Hoorn  
T. 0229 257 257

**Locatie Purmerend**

Waterlandlaan 250  
1441 RN Purmerend  
T. 0299 457 457

**Locatie Volendam**

Heideweg 1b  
1132 DA Volendam  
T. 0229 257 500

**Postbus 600, 1620 AR Hoorn**

[www.dijklander.nl](http://www.dijklander.nl)  
[info@dijklander.nl](mailto:info@dijklander.nl)



FLD-00119-NL 30-08-2024