



Gastroscoopie

met kalmeringsmiddel

Scopiecentrum/Maag Darm Lever

Op verzoek van uw behandelend arts hebben wij een afspraak voor u gemaakt

Op:----- dag

Datum: -----

Opnametijd: ----- uur

Aanvang onderzoek: ----- uur

U mag zich melden bij de informatiebalie in de centrale hal van het ziekenhuis.

Opname

Voor het onderzoek moet u enige uren opgenomen worden.

- Voor locatie **Hoorn** mag u zich melden bij de balie van het scopiecentrum op de 6e etage met lift R. U heeft **geen** afsprakenticket nodig.
- Voor locatie **Purmerend** mag u zich melden bij de balie van het scopiecentrum op de 1e etage, route 75. U heeft een afsprakenticket nodig.

Voor uw eigen rust, de privacy van de andere patiënten en de bewaking van de patiënten tijdens de opname geldt de regel dat er geen familie/begeleiding aanwezig is op de opname/uitslaapkamer.

Gedurende de opname dient u **geen**

- knellende kleding te dragen maar een T-shirt met korte mouwen.
- lippenstift, ringen, andere sieraden of piercing te dragen,
- bodylotion te gebruiken.
- kauwgom in de mond te hebben
- waardevolle spullen, als bijvoorbeeld sieraden, te dragen.

Wij adviseren u

- om een brillenkoker mee te nemen als u een bril draagt
- een gebitten bakje mee te nemen als u een gebitsprothese heeft

Enige tijd na de opname wordt u naar de scopiekamer gebracht voor het onderzoek.

Wachttijd:

Er wordt op meerder kamers onderzoek gedaan en soms kan het gebeuren dat u toch langer moet wachten dan de patiënt die na u komt.

Dit kan door bijvoorbeeld een spoedingreep of onvoorziene omstandigheden op de kamer waar u het onderzoek heeft.

Wij vragen hiervoor uw begrip.

Belangrijk!

Gastroscoopie met sedatie (kalmeringsmiddel)

Omdat de sedatie ook sufheid veroorzaakt mag u tot de volgende ochtend 06.00 uur niet zelf autorijden en ook niet zelfstandig met het openbaar vervoer of met de taxi reizen. U bent niet verzekerd bij het veroorzaken van een ongeval als u onder invloed bent van een slaapmiddel. U moet zelf voor begeleiding en vervoer naar huis zorgen. **Als u géén vervoer naar huis regelt kan het onderzoek met sedatie niet doorgaan!** Het is van belang dat uw begeleiding u ophaalt van de afdeling waar u ligt opgenomen. U kunt niet aan het werk of sporten de rest van de dag. Het wordt op de dag van de sedatie afgeraden om alcohol te drinken en neem geen belangrijke en/of ingrijpende beslissingen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar bijgevoegde folder.

Bij een gastroscoopie bekijkt de arts via de mond het slijmvlies van de slokdarm, de maag en het eerste deel van de twaalfvingerige darm, direct voorbij de maag. Dit is mogelijk met de gastroscoop, een buigzame slang met een doorsnee van een centimeter met aan het eind een videocamera.

Het onderzoek wordt niet altijd uitgevoerd door de arts die het onderzoek met u heeft afgesproken en duurt ongeveer 20 minuten.

Voordat het onderzoek begint, volgen er nog enkele standaard controles. Deze standaard controle heet de “time-out procedure”.

Bent u de juiste patiënt en klopt het onderzoek met de afspraak? Om daar zeker van te zijn, stellen wij u een aantal vragen: uw naam, geboortedatum, het soort onderzoek en of u ergens allergisch voor bent.

Tijdens de gastroscopie ligt u op uw linkerzijde op bed. U krijgt eerst een drankje te drinken (tegen schuimvorming in de maag). Ook worden losse gebitsdelen als een gebitsprothese of plaatje verwijderd uit uw mond. Een bijtring wordt tussen uw kaken geplaatst met een rubberbandje om uw nek om dit te fixeren. Een knijpertje wordt aan de vinger geplaatst om uw ademhaling en hartslag gedurende het onderzoek in de gaten te houden. De arts die het onderzoek doet, spuit voorzichtig het kalmeringsmiddel in. Door de bijtring gaat de gastroscoop de keel in. De arts verzoekt u dan te slikken. Hierdoor komt de gastroscoop gemakkelijk in de slokdarm terecht. Vanaf dit moment wordt de gastroscoop door de arts bestuurd. Door via de slang lucht in te blazen, ontplooien slokdarm, maag en twaalfvingerige darm zich en zijn zo beter te bekijken. Hierdoor ontstaat vaak een opgezet gevoel in de bovenbuik. Een ander gevolg is, dat u last krijgt van opboeren.

Indien nodig neemt de arts tijdens het onderzoek stukjes weefsel weg (bipten). Dit materiaal gaat voor onderzoek naar het laboratorium. Van het nemen van deze bipten merkt u niets.

Mogelijke risico's en complicaties:

Hoewel een gastroscopie over het algemeen een veilig onderzoek is, kunnen er in enkel geval complicaties optreden. Wanneer de patiënt een kalmeringsmiddel gebruikt, neemt de kans op ademhalingsproblemen of stoornissen in de hartfunctie toe.

Wanneer er nog voedsel in de maag van de patiënt aanwezig is, kunt u zich tijdens de gastroscopie hierin verslikken. Als het voedsel in de luchtpijp komt, kan er een longontsteking optreden. Dit gebeurt vaker na toedienen van kalmeringsmiddelen. Krachtig opboeren tijdens het onderzoek kan een beschadiging in het laatste gedeelte van de slokdarm veroorzaken met een lichte bloeding tot gevolg.

Wanneer de gastroscoop moeizaam de keel passeert of wanneer er vernauwingen zijn kan er een scheurtje ontstaan. Deze complicaties komen niet vaak voor en zijn niet ernstig. Ze zijn meteen door de arts zichtbaar en direct te behandelen.

Na afloop kunt u een wat rauw gevoel in de keel ervaren, dit gevoel verdwijnt doorgaans vrij snel.

Medicijnen:

Als u **maagzuurremmers** gebruikt

(omeprazol, losec, pantozol, nexium, prezal, rantidine, cimetidine), kunt u deze blijven gebruiken. Tenzij in het voorgesprek anders is besproken. Op de dag van het onderzoek de maagzuurremmers pas **na** het onderzoek innemen!

Gebruikt u **ijzertabletten** dan is het noodzakelijk dat u hiermee **stopt** zeven dagen voor het onderzoek.

Overleg met uw behandelend arts of u met bepaalde medicijnen moet stoppen. Dit geldt voornamelijk voor de bloedverdünnende medicatie. Het gebruik van deze middelen tijdens het ondergaan van een gastroscopie, kan bij een ingreep, langdurige bloedingen veroorzaken. Bloeddruk- en hartmedicatie en medicatie tegen epilepsie kunt u 's morgens met een slok water innemen.

Diabetes

Heeft u diabetes en gebruikt u tabletten of insuline, neemt u hierover contact op met uw (huis)arts of diabetesverpleegkundige. Indien u insuline gebruikt controleer dan vóór dat u naar het ziekenhuis vertrekt uw bloedsuiker. Het is ook aan te raden uw medicatie voor de diabetes mee te nemen voor na het onderzoek.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde folder.

Vorbereiding:

Een gastroscopie kan alleen goed uitgevoerd worden, wanneer de maag leeg is.

Onderzoek in de ochtend:

- na 24.00 uur (12 uur 's nachts) mag u niet meer eten.

U mag nog **maximaal** 2 bekers water drinken tot 2 uur voor de **opnametijd**.

Onderzoek in de middag na 13.00 uur (1 uur)

- 's morgens voor 06.00 uur een licht ontbijt

Dit mag een beschuit of witbrood zijn zonder boter, met jam en een kopje thee zonder suiker, zonder melk.

Geen vette maaltijd zoals pap, vla en yoghurt.

U mag nog **maximaal** 2 bekers water drinken tot 2 uur voor de **opnametijd**.

Indien u ook een coloscopie krijgt, dan is de informatie voor coloscopie voorbereiding leidend.

Nazorg en uitslag:

In het algemeen wordt u na het onderzoek weer naar de afdeling teruggebracht. U verlaat het ziekenhuis wanneer u weer volledig wakker bent. Dit is gemiddeld 1 uur na het onderzoek. U krijgt de uitslag van het onderzoek van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd op de polikliniek of bij de huisarts, dan is ook de uitslag van het eventuele afgenomen weefsel beschikbaar.

Wanneer u na thuiskomst **binnen 24 uur** na de scopie klachten als toenemende buikpijn of koorts krijgt, moet direct contact worden opgenomen met het ziekenhuis.

Wanneer u grotere hoeveelheden bloed verliest, moet eveneens contact met het ziekenhuis opgenomen worden.

Binnen kantooruren:

Scopiecentrum Hoorn; 0229 257281.

Buiten kantooruren kan men via de receptie van het ziekenhuis contact opnemen met de spoedeisende hulp van locatie Hoorn 0229-257257.

Is het onderzoek langer dan 24 uur geleden dan mag u contact opnemen met uw huisarts als u klachten heeft.

Uw huisarts beoordeelt dan of er contact opgenomen moet worden met het ziekenhuis.

Bereikbaarheid

Locatie Hoorn:

Met de auto via de provinciale weg (N506), u volgt de borden Dijklander Ziekenhuis. Bij het ziekenhuis is een parkeergarage waarvoor moet worden betaald (dagkaart). Het scopiecentrum bevindt zich op de **6e etage, lift R**.

Locatie Purmerend:

Bij het ziekenhuis is een parkeerplaats aan de voorzijde en aan de achterzijde van het ziekenhuis waarvoor moet worden betaald. Het scopiecentrum bevindt zich op de **1e etage, route 75**.

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.30 uur.

Telefoon:: 0229-257281 tot 17.00 uur.

Maag Darm Leverartsen werkzaam in het Dijklander Ziekenhuis

Dhr. A.A. Karimbeg

Dhr. J. Schmidt

Dhr. E. Schnekenburger

Mw. M.S.Vlug

Dhr. X.G. Vos

Dhr. S. Balkema

Mw. M.S.G. Sikkens

Dhr. F.W.J. te Braake

Mw. M.G.F. van Lier

Dhr. P.W. Weijenborg

Dhr. G.A.A. Nibourg

Dhr. B. Meijer

Verpleegkundig endoscopist

Mw. L. Kleimeer-Jansen

Mw. K. van der Vliet

Mw. C. Taam

Mw. P. Heemskerk

Als u nog vragen heeft, stelt u ze dan gerust aan uw arts of aan de verpleegkundige van het scopiecentrum en kijk op onze website: www.dijklander.nl

[illegible]

[illegible]

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00120-NL 10-11-2023