



Het klaarmaken van cytostatica infusen

Klinische farmacie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Over de Klinische farmacie

De Klinische Farmacie is de ziekenhuisapotheek in het WFG.

De Klinische Farmacie bevindt zich op de 3e verdieping.

De Maelson apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis is een andere apotheek. Dit is een poliklinische apotheek.

De Klinische Farmacie verzorgt alle medicijnen voor patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Deze medicijnen worden goed gecontroleerd op o.a. dosering en combinaties van medicijnen.

Ook verzorgen we de medicijnen voor patiënten die nodig zijn voor een behandeling op een polikliniek.

Op de bereidingsafdeling van de Klinische Farmacie worden diverse medicijnen klaargemaakt o.a. cytostatica infusen (=chemokuur).



Wie werken er in de ziekenhuis apotheek?

Op de afdeling Klinische Farmacie werken 47 medewerkers:

- ziekenhuisapothekers
- secretaresses
- farmaceutisch medewerkers
- apothekersassistenten
- unithoofd
- kwaliteitsmanager

De werkzaamheden van de Klinische Farmacie

rondom de cytostatica bereidingen:



Nadat de arts de cytostatica kuur heeft voorgeschreven en alle bloedwaarden goed zijn, wordt een fax gestuurd naar de Klinische Farmacie. Hier worden de dosering en het kuurschema gecontroleerd.

Als er vragen zijn zal de ziekenhuisapotheker contact opnemen met de arts.

De omkleed procedure:

Er is een strikte omkleed procedure om de bereidingsruimte te mogen betreden.

Dit is nodig om de cytostatica infusen te beschermen.

De kleding beschermt ook de bereiders tegen de risicovolle stoffen.

Het klaarmaken van de infuuszak:



In de bereidingsruimte zijn altijd twee apothekersassistenten aanwezig. De infuuszak wordt in een speciale “werkkast” klaargemaakt.

Als de infuuszak klaar is wordt deze vóór het transport naar de afdeling, nogmaals gecontroleerd.

Daarna wordt de infuuszak door een farmaceutisch medewerker naar de afdeling gebracht waar het wordt toegediend.

Controle op bacteriën en schimmels:

Per bereidingsessie wordt op twee manieren gecontroleerd of er geen schimmels

Two TSA (Tryptic Soy Agar) petri dishes and a blood culture bottle. The petri dishes contain a white, opaque medium. The blood culture bottle is labeled 'BLOOD CULTURE' and 'Tryptic Soy Agar' and contains a yellowish-orange liquid. The bottle has two ports at the bottom, one with a white cap and one with a blue cap.

Methode 1:

2 schaaltes met een voedingsbodem:

- schaalte 1: controle van de circulerende lucht in de werkkast.
- schaalte 2: controle van de handschoen van de bereider.

Methode 2:

- met het klaarmaken van een bouillon infuuszakje bootsen we een bereiding na.
In bouillon groeien bacteriën en schimmels snel.

Rondleiding

Als u geïnteresseerd bent in een rondleiding bij de Klinische Farmacie kunt u dit aanvragen via de verpleegkundige van de afdeling.

Voor vragen of opmerkingen, Marjo Kunst
afdeling Klinische Farmacie.

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00826-NL 09-12-2020