



Imiquimod/ Aldara

Behandeling met vaginale creme

Geneesmiddel

Imiquimod creme, ook wel “Aldara” genoemd. Imiquimod stimuleert de aanmaak van bepaalde stoffen in het afweersysteem, waardoor de afweer tegen virussen wordt versterkt. Op dit moment wordt het gebruikt voor de behandeling van sommige vormen van huidkanker en genitale wratten. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van “VIN afwijkingen”. Dit ziektebeeld lijkt op de CIN afwijking die bij u is vastgesteld, maar bevindt zich op de schaamlippen en niet op de baarmoedermond. Imiquimod creme blijkt goed te werken in de behandeling van VIN afwijkingen. Eerdere onderzoeken naar de behandeling van CIN afwijkingen met imiquimod laten veelbelovende resultaten zien, maar meer onderzoek is nodig.

Behandelduur

8-16 weken

U begint met een behandeling van 8 weken. Twee weken na afronding hiervan wordt een colposcopie gepland.


- Indien de afwijking is verdwenen is er geen verdere behandeling met imiquimod nodig. Wel zal er 10 weken daarna opnieuw een colposcopie worden gepland.
- Indien de afwijking kleiner is geworden of hetzelfde is gebleven wordt ervoor gekozen om nog 8 weken met imiquimod behandeld. Twee weken na afloop hiervan wordt er opnieuw een colposcopie gepland.
- Indien de afwijking is toegenomen zal er voor een alternatieve behandeling moeten worden gekozen.

Afspraken

- Telefonisch consult 2 weken na de start met imiquimod ter evaluatie van de eventuele bijwerkingen
- Controle na 5 weken ter evaluatie van de eventuele bijwerkingen
- Controle met colposcopie na 10 weken
- Controle met colposcopie na 20 weken (zie hierboven)

Behandeling

U voert de behandeling zelf thuis uit. U brengt de creme zelf aan, met een vaginale applicator. Dit is een inbrenghulsje voor de creme. Eerst doet u de creme vanuit een zakje in het inbrenghulsje. Vervolgens brengt u het inbrenghulsje vaginaal in, dit is vergelijkbaar met het inbrengen van een tampon. Na het achterlaten van de creme in de schede verwijdt u het inbrenghulsje weer. In het plaatje hieronder ziet u hoe dat inbrengen in zijn werk gaat. U brengt de creme driemaal per week in, 's avonds voor het slapengaan. Na het inbrengen van de creme mag u geen geslachtsgemeenschap hebben. 's Ochtends spoelt u de resten van de creme weg met een vaginale douche (deze kunt u zelf bij de drogist aanschaffen). De behandeling duurt in totaal 8-16 weken.



Welke bijwerkingen kunt u verwachten?

In eerdere onderzoeken met Imiquimod crème werden weinig ernstige bijwerkingen beschreven. De meest voorkomende bijwerking was vaginale afscheiding tijdens de behandeling. Andere bijwerkingen die kunnen voorkomen zijn spierpijn en spierstijfheid, vermoeidheid, hoofdpijn en een koorts gevoel.

Een compleet overzicht van bijwerkingen vindt u hieronder. De meeste van deze bijwerkingen zijn erg zeldzaam. Indien u een bijwerking ervaart, kunt u contact opnemen met uw arts.

Zeer vaak (> 10%): jeuk en pijn op de plaats van aanbrengen en reacties op de plaats van aanbrengen (waaronder bloeding, uitslag, roodheid, afscheiding, branderigheid, irritatie, zwelling, ontsteking, bultjes, blaasjes, gevoelloosheid, schilfering, open wondje, korstvorming, litteken).

Vaak (1-10%): hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn, vermoeidheid en infecties (virale of bacteriële infectie of schimmelinfectie).

Soms (0,1-1%): huiduitslag, jeuk, galbulten, toegenomen transpiratie. Griepachtige verschijnselen, malaise, koorts, spierzwakte, spierstijfheid, gezwollen lymfeklieren. Maag-darmstoornissen, verminderde eetlust of afvallen. Slaperigheid of slapeloosheid, duizeligheid, migraine, depressie. Oorsuizen, blozen, loopneus, keelontsteking, pijnlijke gewrichten en (rug)pijn. Lokale, hevige ontstekingsreacties (met algemene malaise, koorts, misselijkheid en spierpijn) zijn gemeld na slechts enkele malen toedienen. Haaruitval kan optreden. Gemeld zijn verder: pigmentafwijkingen, ernstige huidreacties, leverfunctiestoornissen en daling bepaalde bloedwaarden zoals hemoglobine (bloedijzer), aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes.

Tot slot

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen.

Polikliniek Gynaecologie Purmerend 0299-457138 Polikliniek Gynaecologie Hoorn
0229-257829

[illegible]

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-02150-NL 22-12-2023