

Instructie voor het toedienen van Fraxiparine (Forte)

FRAXIPARINE[®]
Nadroparine Calcium

FRAXIPARINE FORTE[®]
Nadroparine Calcium


Uw arts heeft u Fraxiparine of Fraxiparine Forte voorgeschreven. Dit geneesmiddel bevat nadroparinecalcium, een zogenaamde laagmoleculair gewicht heparine, en wordt gebruikt ter voorkoming en ter behandeling van trombose.

Fraxiparine (Forte) wordt geleverd in een voorgevulde spuit met een veiligheidssysteem, dat dient om te voorkomen dat iemand zich na gebruik per ongeluk aan de naald kan prikken.

Fraxiparine (Forte) is verkrijgbaar in verschillende doseringen. De duur en de dosering van dit middel worden door uw arts vastgesteld.

Hieronder staat stap voor stap beschreven hoe u de injectie Fraxiparine (Forte) toedient. Heeft u vragen, of twijfelt u wat te doen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Onderdelen van de Fraxiparine (Forte) spuit




Bewaar Fraxiparine (Forte):

- Beneden 30 graden en niet in de vriezer of koelkast
- In de oorspronkelijke verpakking ter bescherming van licht
- Buiten het zicht en bereik van kinderen

Gebruik het middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum.

Instructies voor gebruik

- 1 Was uw handen goed met water en zeep en droog uw handen.
- 2 Maak de spuit los en verwijder de spuit uit de verpakking. Het losmaken van de individuele spuiten van de blister, het openen van de blister en het uitnemen van de spuit dient zorgvuldig te gebeuren om beschadigingen van de spuit/naald te voorkomen.
- 3 Haal de spuit uit de verpakking en controleer dat:
 - de uiterste houdbaarheidsdatum niet gepasseerd is
 - de spuit niet beschadigd is of open is
- 4 Ga in een comfortabele positie zitten of liggen. Kies een plaats in het onderbuikgebied, ten minste 5 cm onder de navel.



Werkwijze:

Vouw de blister tussen twee spuiten tweemaal heen en weer. Daarna kan de spuit in de blister losgemaakt worden van de rest van de spuiten door een V-vorm te maken. Niet scheuren. Er is geen druk op de blister nodig. Het PVC en de folie mogen niet uitgerekt worden. Er mogen geen witte markeringen ontstaan. Het is niet nodig de blister fijn te knijpen of te draaien.

Wissel de injecties af tussen de linkerkant en de rechterkant van de onderbuik. Dit helpt om ongemakken op de injectieplaats te voorkomen. Indien een injectie in de onderbuik niet mogelijk is vraag dan uw verpleegkundige of uw arts om advies. Vermijd bij injectie de omgeving van een eventueel bestaande wond.

- 5 Verwijder de naaldhuls door deze eerst te draaien



en trek deze dan in een rechte lijn van de naald af.



Gooi de naaldhuls weg.



VIATRIS[™]

Instructie voor het toedienen van Fraxiparine (Forte)

FRAXIPARINE[®]
Nadroparine Calcium

FRAXIPARINE FORTE[®]
Nadroparine Calcium

6. Neem een huidplooi tussen duim en wijsvinger en houd deze huidplooi tussen duim en wijsvinger gedurende de gehele injectie.



7. Houd de spuit stevig rechtop bij de vingergrip. Breng de naald in zijn geheel loodrecht (rechtstandig, onder een hoek van 90 graden) in de huidplooi.



Niet opzuigen.

8. Spuit alle vloeistof langzaam in, door de zuiger zo ver mogelijk naar beneden. Verwijder dan voorzichtig de naald uit de huid.



Niet wrijven. Als de injectieplaats gaat bloeden, moet u enkele minuten met een vinger op de injectieplaats drukken.

9. Na de injectie schuift u de veiligheidshuls over de spuit in de richting van de naald



totdat u "klik" hoort.



Houd daarbij de veiligheidshuls in één hand vast en houd met de ander hand de vingergrip stevig vast. Trek de veiligheidshuls stevig over de spuit.

De veiligheidshuls is nu vergrendeld en de naald is afgeschermd. U kunt zich niet meer per ongeluk prikken met deze naald.

Gooi de gebruikte spuit niet weg met het huishoudelijk afval. Verwijder deze volgens de instructies van uw arts of apotheker.


! Let op: Raak de naald niet aan en laat deze nergens mee in contact komen voor de injectie. Het is normaal dat u een kleine luchtbel in de spuit ziet. Verwijder de luchtbel niet voor injectie, anders verliest u een gedeelte van het geneesmiddel.

! Bent u een dosis Fraxiparine (Forte) vergeten te gebruiken?
Injecteer de dosering direct als u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor de volgende dosering, kunt u wachten tot dat tijdstip. In dat geval slaat u de vergeten dosering over. Injecteer geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Raadpleeg uw arts of apotheker als u twijfelt wat u moet doen.

Heeft u teveel Fraxiparine (Forte) gebruikt? Neem voor advies zo snel mogelijk contact op met uw arts of apotheker, omdat er een verhoogde kans op een bloeding bestaat.

Let op: Lees voor het gebruik van dit geneesmiddel altijd de bijsluiter.

Als het volume in de spuit meer is dan u nodig heeft, moet u eerst de overtollige vloeistof verwijderen voordat u zichzelf injecteert.



- Houd de spuit met de naald recht naar beneden.
- Duw de zuiger van de spuit voorzichtig naar beneden totdat de bodem van de luchtbel en dus het oppervlak van de vloeistof op de juiste maatstreef van het volume staat dat uw arts heeft voorgeschreven.
- Vang de vloeistof die uit de naald komt op via een tissue en gooi deze weg.
- De spuit is nu klaar voor gebruik.