
Adviezen na de punctie

Start Utrogestan zodra je thuis bent d.w.z. 2 maal 1 capsule vaginaal inbrengen. Vanaf morgen 3x daags 1 capsule tot aan zwangerschapstest in het bloed.

Je kunt zo nodig doorgaan met Paracetamol 1000 mg 3 x daags en eventueel Naproxen 2x daags.

Neem voldoende rust en ga pas fysieke inspanningen doen als je lichaam dit toelaat.

Bruine afscheiding of beperkte mate van helderrood bloedverlies is normaal na een punctie.

Neem contact op via 0299-457075 bij:

- Hevige buikpijnklachten welke niet te onderdrukken zijn met pijnstillers
- Combinatie van buikpijnklachten en koorts meer dan 38 °C
- Als je elk half uur een bijna doordrenkt maandverband hebt
- Als je niet kunt plassen
- Als je gewicht meer dan 1 kg of meer per dag toeneemt
- Als je benauwd wordt
- Als je buik in omvang toeneemt

Tijdens kantoortijden krijg je rechtstreeks de verpleegkundige van Cvk aan de lijn. 's Avonds en 's nachts de centralist, zij verbindt je door.

De embryoloog neemt in de loop van de dagen telefonisch contact op met jullie. Hij/zij zal laten weten hoe de embryo's zich ontwikkelen en wanneer de terugplaatsing hiervan is.

De zwangerschapstest staat gepland op Dit is 18 dagen na de punctie. Indien je wat bloedverlies hebt, ga dan toch door met de Utrogestan. Indien je ruim bloed verliest, zoals bij een menstruatie, stuur dan een e-consult.

Vergeet de Foliumzuur niet.

Succes gewenst namens het hele team van
Centrum voor kinderwens