



Lipbiopt

Reumatologie

Als uw reumatoloog denkt dat er sprake kan zijn van de ziekte van Sjogren, kan hij of zij voorstellen een lipbiopt te laten afnemen.

In ons ziekenhuis wordt het lipbiopt afgenomen door een KNO arts. De KNO arts maakt een klein sneetje in uw lip en neemt een beetje materiaal uit uw lip. In dit materiaal zitten kleine speekselklieren. Deze kunnen worden bekeken onder de microscoop.

Doel

Dit onderzoek kan bevestigen dat u de ziekte van Sjogren heeft. Het is niet altijd nodig om een lipbiopt af te nemen.

Vorbereiding

U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden op een lipbiopsie. Wel zijn er enkele dingen waar u van te voren aan moet denken:

- Het is beter geen lipstick te dragen.
- Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, meld dit dan voor het nemen van het lipbiopt aan de KNO arts. Het stoppen met bloedverdunnende medicijnen is bijna nooit nodig.
- Heeft u in het verleden een allergische reactie op een verdovingsmiddel gehad, meld dit dan van te voren aan de KNO arts.
- Wij adviseren iemand mee te nemen.

Voor de lipbiopsie neemt de KNO arts nog kort de ingreep met u door. Ook vraagt hij om uw goedkeuring om het lipbiopt bij u te mogen afnemen.

Ingreep

De lipbiopsie duurt ongeveer 10 minuten. U krijgt plaatselijke verdoving via een prikje in de onderlip. Deze verdoving is vergelijkbaar met een verdoving zoals die door de tandarts wordt gegeven.

Vervolgens wordt er een klein sneetje (8 tot 10 millimeter) gemaakt en worden enkele speekselklierjes weggenomen. Eventueel worden er hechtingen geplaatst maar in de meeste gevallen is afdrukken van het wondje voldoende.

Na de ingreep

Als alles goed gaat, mag u na de ingreep direct weer naar huis. Wel is het verstandig om iemand mee te nemen, Het is belangrijk om te weten dat de verdoving niet direct is uitgewerkt, Past u daarom op met het drinken van warme dranken; u zou zich namelijk kunnen branden zonder het te voelen,.

Meestal heeft u dezelfde dag al geen last meer van het wondje in uw mond.

Thuis kunt u er met ijswater of een ijsje voor zorgen dat de bloedvaatjes goed dichtgaan en de zwelling van de lip wordt voorkomen.

Na de behandeling blijft de lip nog enige tijd gevoelloos. Dit duurt meestal een paar uur. Ook kan de lip nog een paar dagen gevoelig blijven.

De eventuele hechtingen lossen binnen een week vanzelf op.

Complicaties

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan. Bij een lipbiopsie komen bijna nooit ernstige complicaties voor.

- Meestal zwelt de lip gedurende 2 tot 3 dagen wat op. Dit is normaal.
- Soms lost een hechting vertraagd of niet op. Als een hechting langer dan 5 tot 7 dagen blijft zitten, dan kan dat een ontstekingsreactie geven. Neem dan contact op met de polikliniek KNO. De hechtingen kunnen daar eenvoudig verwijderd worden, waarna de klachten snel zullen verdwijnen.
- Het wondje kan gaan bloeden. Druk dan een gaasje tegen het wondje aan. Het bloeden stopt dan meestal. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de polikliniek KNO.
- In zeldzame gevallen kan een gevoelszenuw in uw onderlip beschadigd raken. U heeft dan een doof gevoel in uw onderlip. Tegenwoordig is de snede bij een lipbiopsie zo ondiep dat dit risico heel klein is. Heeft u toch een doof gevoel in uw onderlip, dan verdwijnt dit meestal binnen een aantal maanden.

Nabehandeling

De uitslag van de lipbiopsie krijgt u via uw behandelend arts/reumatoloog.

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-02429-NL 23-06-2025