

Datum:

Tijd:

Mantoux test

Met behulp van dit onderzoek kan de behandelend arts een infectie met de tubercelbacterie vaststellen.

U krijgt voor dit onderzoek 2 afspraken, één om de mantoux te zetten en één 2 à 3 dagen later om de mantoux af te lezen. Per keer neemt dit ongeveer 10 minuten in beslag.

De voorbereiding

Er is voor dit onderzoek geen speciale voorbereiding noodzakelijk.

Het onderzoek

Met een hele dunne injectienaald wordt er een kleine hoeveelheid testvloeistof in de huid van uw linker onderarm gespoten. Het inspuiten van de vloeistof kan pijnlijk zijn. De plaats van de injectie wordt op uw huid met pen aangegeven. Zorgt u ervoor dat deze markering zichtbaar blijft, dit om het aflezen te vergemakkelijken.

Om allergische reacties te voorkomen wordt de huid niet ontsmet en wordt er geen pleister gebruikt.

Na de injectie kunt u soms een reactie van de huid verwachten. Deze kan bestaan uit een verdikking, roodheid, jeuk of een blaar ter plaatse van de injectie.

Na 3 dagen wordt de reactie van de huid bekeken en de omtrek van de aanwezige verdikking en roodheid opgemeten. Deze bepaalt of de test positief of negatief is.

De uitslag krijgt u van uw behandelend arts.

Tot slot

Deze uitleg is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als een aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk thuis alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen over deze test dan kunt u ze vooraf aan het onderzoek aan de longfunctieanalist(e) stellen of neem contact op met de Longfunctie afdeling, telefoon (0299) 457 588.

Met algemene vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist, die ook de uitslag van de test met u zal bespreken.