



Medicatie voor endoscopie

Interne geneeskunde

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Medicatie voor endoscopie

Gebruikt u een of meer van de onderstaande soorten medicijnen dan kunt u hier vinden hoe deze te gebruiken rond een scopie.

Bloedverduunners

In principe kunt u voorafgaand aan **diagnostische endoscopieën** plaatjesaggregatieremmers zoals ascal, carbasalaat, clopidogrel doorgebruiken . Gebruikt u de combinatie van 2 van deze middelen overleg met uw behandelend arts.

Voor Coumarine derivaten (sintrom of marcoumar) geldt: voor een diagnostische endoscopie streven naar therapeutische antistolling [meestal INR 2,5].

Coumarine derivaten en soms ook plaatjesaggregatieremmers zullen alleen gestaakt worden voorafgaande aan een **ERCP of een geplande ingreep met een hogere kans op bloeding zoals colonoscopie met poliepverwijdering**- in overleg met uw behandelend arts.

Profylaxe

Soms is het vanwege de medische voorgeschiedenis noodzakelijk voorafgaande aan een endoscopische ingreep met antibiotica behandeld te worden. Dit zal plaatsvinden in overleg met uw behandelend arts.

Ijzertabletten: stop deze 1 week voor de colonoscopie in verband met het verkleuren van de ontlasting

De pil/orale anticonceptie: deze is na voorbereiden voor colonoscopie voor de rest van de cyclus onbetrouwbaar.

Diabetes Mellitus (suikerziekte)

tabletten: niet innemen op de dag voor het onderzoek en ook niet op de ochtend van de onderzoeks dag

Insulinegebruik:

De dag **voor het onderzoek** volgt u het schema van de onderstaande tabel:

Insulineschema geldig voor de dag voor het onderzoek.

Schema	Ochtend	Middag	Avond	Voor het slapen
1X daags (ochtend)	Normale dosering			
1X daags (avond)				Helft van normale dosering
2X daags	Normale dosering		Helft van normale dosering	
4X daags	Normale dosering	Normale dosering	Dosering afhankelijk van koolhydraat inname	Helft van normale dosering

De dag van het onderzoek: de helft van de normale ochtend dosering spuiten – na de scopie. Neem druivensuiker [dextro e.d.] mee voor het geval van te lage waardes ondanks deze maatregelen. Bij een te lage suiker thuis kunt u vruchtensap of limonade zonder prik drinken. Bepaal vaker jouw bloedsuikers met het metertje.

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00113-NL 09-12-2020