Mesalazine

DIJKLANDER ZIEKENHUIS

Inleiding

De arts of verpleegkundig specialist heeft samen met u besloten om u te behandelen met mesalazine. In deze folder krijgt u nadere informatie over dit medicijn.

Mesalazine

Mesalazine (b.v.Asacol, Mezavant, Pentasa, Salofalk) remt de ontsteking. Het kan even duren voor u het effect bemerkt. Als het middel goed uitpakt kunt u het jarenlang blijven gebruiken. Afhankelijk van de plaats van ontsteking kiest de arts voor tabletten/korrels/klysmata/schuim/zetpillen of een combinatie hiervan.

Gebruik

Tabletten en granulaat

- Heel doorslikken met een half glas water, niet kauwen.
- Pentasa-korrels kunnen vooraf op wat voedsel gestrooid worden, b.v. yoghurt.
- Pentasa-tabletten kunt u vooraf in een paar minuten in vloeistof uiteen laten vallen. Let op dat u alle “korreltjes” inneemt en dat u er niet op kauwt.

Zetpillen

- Zorg ervoor dat uw endeldarm leeg is voordat u de zetpil inbrengt.
- Was u handen voor en nadat u een zetpil inbrengt.
- Verwijder het folie van de zetpil (zie bijsluiter die door de apotheek is meegeleverd).
- Breng de zetpil in de anus. Het maakt niet uit of u de zetpil met de punt naar voren of met de stompe kant naar voren inbrengt. Als u de zetpil met een beetje water bevochtigt, kunt u hem wat makkelijker inbrengen. Duw met een vinger de zetpil helemaal naar binnen want anders is het niet denkbeeldig dat uw sluitspier de zetpil onwillekeurig weer naar buiten duwt.
- Als u de zetpil binnen 10 minuten verliest, kunt u een nieuwe inbrengen.

Klysma

- Laat de klysma op lichaamstemperatuur komen, b.v. in een lauwwarm waterbadje. Door het klysma op lichaamstemperatuur te brengen, wordt het klysma beter verdragen, en geeft het minder buikkrampen.
- Ga op de linkerzij liggen. Houd uw onderste been gestrekt en het bovenste gebogen.
- Schud de klysma goed. Breng de tuit van de klysma voorzichtig in de anus [tuit insmeren met vaseline]
- Knijp de fles zo veel mogelijk leeg en trek deze weer uit de anus. Houd de fles ingedrukt als u hem terugtrekt. Er blijft altijd een beetje vloeistof achter in de verpakking.
- Blijf op uw linkerzij liggen, of indien u dat prettiger vindt rol op uw buik, en blijf ongeveer vijf tot tien minuten zo liggen om te voorkomen dat de vloeistof er weer uit komt.
- Houd er rekening mee dat wanneer u vloeistof knoeit, of als de vloeistof wegloopt, dit bruine vlekken veroorzaakt in linnengoed. Deze vlekken zijn er niet meer uit te wassen. U kunt dit voorkomen door bijvoorbeeld op een absorberend matje te gaan liggen.

Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen kunnen ontstaan door het gebruik van mesalazine:

- Bij klysma en zetpillen: prikkelend gevoel in de anus.
- Maag- of darmklachten, zoals braken, diarree, buikpijn of misselijkheid. Advies: neem het medicijn tijdens of net na de maaltijd.
- Hoofdpijn.
- Stemmingsveranderingen.
- Overgevoeligheidsreacties (huiduitslag, jeuk, netelroos, koorts).

Neem direct contact op met uw MDL arts/ MDL verpleegkundige bij

- Huiduitslag.
- Ontsteking van het mondslijmvlies.

Zwangerschap en borstvoeding

In een dosering tot twee gram per dag kunt u dit medicijn gebruiken. Overleg met uw arts als u een hogere dosering moet gebruiken.
Mesalazine gaat in geringe mate over in de moedermelk. Overleg met uw arts.

Bloedonderzoek:

Om eventuele bijwerkingen op de nierfunctie vroegtijdig te ontdekken is regelmatig bloedonderzoek nodig. U kunt daarna zelf een telefonische afspraak maken of een mail sturen naar het algemene mailadres van de MDL-verpleegkundige voor de uitslag.

Vragen

Als u nog vragen heeft of wanneer u twijfelt, neem dan gerust contact op met uw verpleegkundig specialist. Voor afspraken neemt u contact op met de polikliniek Maag-, Darm-en Leverziekten.

Belangrijke telefoonnummers en e-mail:

Voor niet spoedeisende vragen:
Denk hierbij aan vragen voor herhaalrecepten, informatie ter voorbereiding poliafspraak en voorleggen van langer bestaande problemen.
Email: IBD_zorg@dijklander.nl Wij streven ernaar om vragen zoveel mogelijk binnen 24-48 uur te beantwoorden.
NB. Vermeld altijd uw patiëntennummer of uw achternaam en geboortedatum en de locatie waar u onder behandeling bent.

Voor spoedeisende vragen:
Dagelijks telefonisch spreekuur tussen 14:00 en 16:00 uur op 0229-257800. Denk hierbij aan acute klachten zoals diarree, bloedverlies, koorts en buikpijn.

Spoedeisende Hulp (buiten kantoortijden en in het weekend)
Telefoonnummer: 0229-257257

Notities:

Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn
Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl

FLD-00099-NL 22-12-2022

DIJKLANDER ZIEKENHUIS