

MIP-MEP meting

Bij het functioneren van de longen spelen ook de ademhalingsspieren een rol. Door middel van deze test kan de kracht van de ademhalingsspieren gemeten worden.

De voorbereiding

Er is geen speciale voorbereiding noodzakelijk. Uw (long)medicatie mag u gewoon doorgebruiken.

Het onderzoek

Bij deze longfunctietest ademt u via een mondstuk aan een longfunctieapparaat. De neus wordt met een klem dichtgehouden om te voorkomen dat u door de neus ademt. U moet dan enige tijd normaal ademen. Vervolgens ademt u maximaal in of uit waarna u enige seconden met kracht tegen een gesloten klepje blaast of zuigt. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Tot slot

Deze uitleg is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als een aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk thuis alles nog eens rustig na te lezen. Heeft u nog vragen over deze test dan kunt u ze vooraf aan het onderzoek aan de longfunctieanalist(e) stellen of neem contact op met de Longfunctie afdeling, telefoon (0299) 457 588.

Met algemene vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist, die ook de uitslag van de test met u zal bespreken.