



Nastaar

laserbehandeling

Polikliniek Oogheelkunde

Wat is nastaar?

De eigen lens bevindt zich in het lenskapsel. Bij een staaroperatie wordt het lensje met ultrasonische geluidsgolven uit het oog verwijderd. Het lenskapsel blijft in het oog achter. Hierin wordt vervolgens het kunstlensje geplaatst. Na verloop van tijd (wisselend van maanden tot jaren) kan in sommige gevallen dit kapsel troebel worden, zodat de gezichtscherpte geleidelijk aan afneemt en het lijkt alsof de staar terugkeert. Dit verschijnsel heet nastaar.

Behandeling van nastaar

Nastaar kan behandeld worden met een laser, een apparaat dat werkt met een lichtstraal.

Voor deze behandeling is het nodig dat uw pupillen zijn verwijd. De polikliniek-assistente zal u op de polikliniek druppelen. De ingreep is eenvoudig en pijnloos en vindt plaats op de polikliniek. U neemt voor de behandeling plaats op een stoel achter het laserapparaat. Het hoornvlies wordt met verdovende oogdruppels verdoofd. De oogarts plaatst een gelei-achtige oogdruppel en een contactlensje (vergrootglas) op het hoornvlies. Hierdoor kunt u tijdens de behandeling niet meer knippen.

Tijdens de laserbehandeling wordt met behulp van een zeer dunne lichtstraal een opening gemaakt in het troebele lenszakje, zodat u er weer helder doorheen kunt kijken.

Direct na de laserbehandeling ziet u enige tijd wazig door de gelei-achtige oogdruppels die worden gebruikt tijdens de behandeling en door de pupilverwijdende oogdruppels. Dit trekt vrij snel weg. Het is verstandig om na de behandeling niet zelf auto te rijden.

Risico's van de behandeling

Na afloop van de behandeling ziet u enige dagen tot enige weken bewegende grijze vlekjes voor het behandelde oog. Dit zijn de brokstukjes van het vliesje dat door de behandeling is opengemaakt. Deze zakken in de loop van de tijd vaak omlaag waardoor ze uit het beeld verdwijnen.

Bij sommige kunstlensjes (niet bij het type dat in ons centrum wordt gebruikt) kan de laserstraal kleine stipjes in het lensmateriaal veroorzaken. Deze zijn alleen zichtbaar met de microscoop en storen het zien niet.

Er kan een geringe steriele ontstekingsreactie optreden na de nistaaroperatie. Dat is ook de reden dat u ontstekingsremmende oogdruppels moet gebruiken na afloop van de behandeling.

Er bestaat een kleine kans op netvliesloslating (< 1%) en op een tijdelijk verhoogde oogdruk (eveneens < 1%). De waarschuwingssignalen voor een netvliesloslating zijn lichtflitsen in het oog en uitval van een deel van het beeld.

Als u deze verschijnselen merkt is het verstandig om direct contact op te nemen met ons voor een spoedconsult.

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



WLZ-19612-NL 8 november 2021