

Tobramycine oogzalf of fusidinezuur ooggel rond de PD-katheterpoort

U krijgt van de arts of van de PD-verpleegkundige te horen wanneer u tobramycine oogzalf of fusidinezuur ooggel rond de PD-katheterpoort (=huidpoort) moet gaan gebruiken.

Meestal is dit n.a.v. een kweekuitslag.

Benodigheden:

- 2 kleine steriele gaasjes: 5 x 5 cm
- Tobramycine oogzalf (tobrex): 0,3%: 3 mgr/gr: tube van 3,5 gr. **of**
- Fusidinezuur ooggel (fucithalmic): 10 mgr./gr. tube: 5 gr.
- Handen alcohol
- Z.n. een steriele pleister: 5x5cm.

NB: U krijgt een recept van de arts voor de **oogzalf/ooggel**.

Werkwijze:

- Tobramycine oogzalf of fusidinezuur ooggel wordt **1x daags** aangebracht na de dagelijkse katheterpoort verzorging.
- Let op de houdbaarheidsdatum.

Uitvoering:

- Verzorg de katheterpoort zoals u geleerd is.
- Open de verpakking van de steriele gaasjes: laat de gaasjes in de verpakking liggen.
- Doe een klein beetje zalf op een steriel gaasje om het bovenste onsteriele laagje te verwijderen.
- Doe daarna een beetje zalf op het andere steriele gaasje.
- Desinfecteer handen met handen alcohol.
- Breng de zalf in één streek aan rond de katheterpoort; werk vanaf de poortrand naar buiten.
- Plak z.n. de katheterpoort af en fixeer deze in het verlengde van de tunnel: in de PD-belt of met pleisters.

Nazorg:

- **Tobramycine oogzalf of fusidinezuur ooggel is ná opening 1 maand houdbaar op kamertemperatuur. Zet openingsdatum op het doosje.**
- Indien nodig worden er vervolgafspraken gemaakt voor controle van de katheterpoort.
- Indien nodig wordt er een kweek afgenomen van de katheterpoort.
- Neem altijd contact op met het Niercentrum wanneer de katheterpoort niet verbeterd of juist verslechterd/veranderd. Doe geen zalf op de poort. Mogelijk moet er een kweek afgenomen worden.

- Gebruik altijd tobramycine oogzalf en fusidine ooggel en geen tobramycine/fusidine huidzalf/-creme; in huidzalf/-creme zit alcohol waardoor de PD-katheter poreus kan worden.
- Indien u ook bactroban neuszalf in de neus gebruikt: verzorg eerst de PD- katheterpoort en doe daarna de neuszalf in de neus.