




Oogonderzoek bij het gebruik van Nivaquine of Plaquenil

Afdeling Oogheelkunde

Locatie Purmerend/Volendam

U bent voor behandeling van een huidaandoening of reumatologische aandoening gestart met het medicijn Nivaquine of Plaquenil. U heeft bij gebruik van deze medicijnen een grotere kans op de oogaandoening retinopathie. Dit is ernstige schade aan het netvlies. Uw arts heeft u daarom naar de oogarts verwezen voor onderzoek naar eventuele retinopathie.

In deze folder vindt u uitleg over dit onderzoek en over de klachten die mogelijk op retinopathie wijzen.



Netvliesbeschadiging

De middelen Nivaquine (chloroquine) en Plaquenil (hydroxychloroquine) worden gebruikt voor de behandeling van verschillende reumatologische en dermatologische aandoeningen en voor de bestrijding van malaria.

Bij 1 op de 200 gebruikers ontstaat ernstige schade aan het netvlies. Dit wordt retinopathie genoemd. Ook kunnen deze middelen schade aan het hoornvlies veroorzaken. Deze schade is meestal tijdelijk van aard en daardoor minder ernstig dan schade veroorzaakt aan het netvlies.

Er zijn factoren die de kans op het ontstaan van retinopathie verhogen:

- een hoge dosering Plaquenil (meer dan 6,5 mg per kg lichaamsgewicht)
- een hoge dosering Nivaquine (meer dan 3 mg per kg lichaamsgewicht)
- gebruik van Plaquenil of Nivaquine langer dan 5 jaar
- onder- of overgewicht
- nier- of leverziekten
- leeftijd ouder dan 60 jaar
- reeds bestaande oogaandoeningen

Welke klachten kunt u hebben?

De meest voorkomende klachten die u kunt krijgen bij het gebruik van Nivaquine of Plaquenil zijn:

- het zien van een schemering voor de ogen
- overgevoeligheid voor licht
- moeite met het scherp zien, bijvoorbeeld bij het lezen
- het fletser zien van kleuren
- het zien van lichtflitsen

Deze klachten kunnen ook door andere oorzaken ontstaan. Maar er zijn 2 klachten die wel kenmerkend zijn voor het gebruik van Nivaquine en Plaquenil, namelijk:

- Het waarnemen van een kleurloze kring rondom lichtbronnen. Dit wordt ook wel een halo genoemd.
- Uitval van een stuk gezichtsveld of vervorming van het gezichtsveld.

De laatste twee klachten kunt u testen met behulp van de Amsler kaart. Dit is een hulpmiddel om vroegtijdige vertekeningen van het beeld op te sporen en veranderingen waar te nemen.

Zo werkt de Amsler kaart


Sluit een oog en kijk naar het centrale punt.

Noteer of u:

- de hele kaart of maar een deel van de kaart ziet
- rechte of vervormde lijnen ziet
- andere vervormingen ziet

Herhaal deze handeling met uw andere oog.

Een aantal van de bovenstaande klachten verdwijnt na het stoppen met de Nivaquine of Plaquenil. Heeft u (één van) deze klachten? Neem dan contact op met uw huisarts.



Het oogonderzoek

Binnen een jaar na het starten van Nivaquine of Plaquenil wordt u door de reumatoloog of dermatoloog doorverwezen naar de oogarts voor onderzoek van uw ogen. Bij het bezoek aan de oogarts worden uw ogen grondig onderzocht. Als het nodig is kan de oogarts ervoor kiezen om aanvullende onderzoeken uit te laten voeren. Zo krijgt de oogarts een nog beter beeld van de conditie van uw ogen.

Controle

U hoort van de oogarts wanneer de volgende controle nodig is.

Contactgegevens

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze folder, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde, telefoon (0299) 457 136.

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



WLZ-23444-NL 10 december 2020