



Overdracht van infecties bij ERCP

Interne geneeskunde

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Overdracht van infecties bij ERCP

Uw MDL-arts heeft u voorgesteld om een ERCP (Endoscopische retrograde cholangio- en pancreaticografie, dat is een kijkonderzoek van de galwegen en afvoergang van de alvleesklier) te ondergaan. Uw arts heeft u daarbij op de hoogte gesteld van de risico's en de mogelijke complicaties van het onderzoek.

De Maag Lever Darm Stichting heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen een uitgebreide brochure over de ERCP gemaakt, waarin het onderzoek en de mogelijke complicaties beschreven zijn. Deze voorlichtingsbrochure is beschikbaar op de MDL-poli of afdeling, of is in te zien via de MLDS website (zie www.mlds.nl).

U krijgt deze aanvullende informatie omdat in de afgelopen jaren een zeer klein aantal patiënten een infectie na een ERCP heeft gekregen. Deze infectie wordt overgedragen door de ERCP-endoscoop zelf, ondanks dat deze zorgvuldig en volgens handleiding van de fabrikant gereinigd en gedesinfecteerd is. Deze overdracht van infecties geldt niet voor onderzoeken met gastro- en coloscopen, maar alleen voor onderzoeken met een ERCP-scoop.

Deze infectieoverdracht komt niet alleen in Nederland voor, maar ook in andere landen waar ERCP's gedaan worden. De ziekenhuizen hebben naar aanleiding van deze incidenten vanzelfsprekend maatregelen genomen om de kans op een overdracht zo klein mogelijk te maken. De kans op het krijgen van een infectie is uiterst klein, maar de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen vindt het toch belangrijk dat u vóór het onderzoek ervan op de hoogte wordt gesteld. Daarom geven wij u de onderstaande aanbevelingen.

Aanbevelingen

- Bespreek de voordelen en risico's van het onderzoek met uw behandeld arts. In de meeste gevallen is de gezondheidswinst die een ERCP voor u oplevert veel groter dan de zeer kleine kans op een infectie. Bedenk daarbij dat het onderzoek vaak uitgevoerd moet worden om een levensbedreigende situatie te behandelen of te voorkomen.
- Vraag aan uw behandelend arts wat u kunt verwachten na de procedure en bij welke symptomen u contact moet opnemen met het ziekenhuis. Na een ERCP hebben veel patiënten last van milde symptomen zoals een gevoelige keel of geringe buikklachten. Neem in ieder geval contact op met het ziekenhuis of uw behandeld arts als u na de procedure koorts of koude rillingen krijgt, of andere klachten die kunnen wijzen op een ernstige complicatie (bijvoorbeeld pijn op de borst, hevige buikpijn, niet goed kunnen slikken of doorademen, misselijkheid of overgeven, of zwarte ontlasting).

Deze informatie is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM).

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00077-NL 09-12-2020