



Parenterale voeding

(buiten het maag-darmkanaal om)

Dietetiek

Parenterale voeding

Inleiding

Als er sprake is van een (deels) niet werkend maag-darmkanaal wordt gestart met parenterale voeding om in de voedingsbehoefte te voorzien. Dit is van belang om ervoor te zorgen dat u voldoende voedingsstoffen, vitamines en mineralen binnenkrijgt voor het herstel, om de voedingstoestand te behouden en optimaliseren. Parenterale voeding wordt toegediend via een speciaal infuus in een groot bloedvat. Parenterale voeding kan zowel tijdelijk als voor langere duur gebruikt worden.

Wat is parenterale voeding

Parenterale voeding is voeding die rechtstreeks in de bloedbaan wordt toegediend. Parenteraal betekent buiten het maag-darmkanaal om.

Parenterale voeding bevat alle voedingsstoffen die het lichaam nodig heeft, zoals energie, eiwit, vet en koolhydraten, maar ook vocht, vitamines en mineralen.

Het wordt daarom ook wel totale parenterale voeding (TPV) genoemd. Er zijn verschillende soorten parenterale voedingen beschikbaar.

Hoeveelheid en soort parenterale voeding

De hoeveelheid en soort voeding die u krijgt is afgestemd op uw individuele voedingsbehoefte. De diëtist rekent uw voedingsbehoefte uit en past het advies voor de hoeveelheid voeding hier op aan.

Starten met parenterale voeding

Zodra de centraal veneuze catheter is ingebracht, kan gestart worden met parenterale voeding. De voeding loopt druppelsgewijs in, in 24 uur. In de meeste gevallen kan gelijk gestart worden met de totale hoeveelheid voeding, die u nodig heeft.

Als er echter sprake is van een slechte voedingstoestand bij aanvang van de voeding wordt er voor gekozen om de voeding langzaam op te bouwen.

Eten en drinken naast parenterale voeding

Als parenterale voeding wordt gestart omdat er sprake is van een niet werkend maag-darmkanaal wordt het afgeraden om zelf iets te eten of te drinken. Als parenterale voeding als aanvullende voeding wordt gebruikt bij een (deels) werkend maag-darmkanaal, kunt u daarnaast wel eten en drinken. Dit wordt door uw arts en diëtist met u besproken.

Parenterale voeding thuis

De verblijfsduur in het ziekenhuis is over het algemeen kort. De behandeling met parenterale voeding kan dan thuis voortgezet worden. Hier wordt voor gekozen als het (nog) niet mogelijk is om voldoende voedingsstoffen (en/of vocht) op te nemen via het maagdarmstelsel.

Als u korter dan 3 maanden parenterale voeding thuis nodig heeft, blijft u onder behandeling van uw arts en diëtist van het ziekenhuis. U heeft meestal wekelijks contact. De apotheek zorgt dat de juiste voeding en materialen thuis worden afgeleverd. Daarnaast wordt een speciaal wijkteam van de thuiszorg ingezet voor de zorg rondom de parenterale voeding en toedieningsmaterialen.

Indien u langer dan 3 maanden parenterale voeding in de thuissituatie nodig heeft, wordt u doorverwezen naar een gespecialiseerd centrum (het Amsterdam UMC locatie AMC in Amsterdam of het Radboud UMC in Nijmegen) en leert u indien mogelijk zelf parenterale voeding toe te dienen. De behandeling wordt dan overgenomen door de arts en diëtist aldaar.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over deze brochure, dan kunt u terecht bij de afdeling diëtetiek van het ziekenhuis: telefoonnummer (0229) 257 257 of dietist@westfriesgasthuis.nl.

februari 2019

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-01155-NL 10-12-2020