



Zoledroninezuurinfuus

Zoledroninezuur infuus (Aclasta®)

Uw behandelend arts/ verpleegkundig specialist heeft u Zoledroninezuur voorgeschreven voor de behandeling van uw osteoporose, met als doel het voorkomen van botbreuken.

Als u dit medicijn krijgt, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet.

Het effect van Zoledroninezuur

Zoledroninezuur is een bisfosfonaat. Bisfosfonaten zijn medicijnen die aan botweefsel hechten en hierdoor de botafbraak remmen, de botdichtheid vergroten en het risico op botbreuken beperken.

Meestal wordt gestart met bisfosfonaten in tabletvorm. Maar als deze tabletten niet goed verdragen worden of als er sprake is van slokdarm of maagklachten kan behandeling met een bisfosfonaat per infuus, zoals Zoledroninezuur, een goed alternatief zijn. Doordat Zoledroninezuur in hoge mate aan botweefsel hecht, is het gedurende een lange periode werkzaam en is een behandeling eens per jaar voldoende.

Behandeling met Zoledroninezuur

Zoledroninezuur wordt per infuus toegediend. Meestal wordt het infuus thuis toegediend door Eurocept Homecare. Zonodig vindt toediening plaats op het Dagcentrum.

Voor de gehele procedure moet u een uur reserveren. De duur van het infuus is dertig minuten.

Om uitdroging te voorkomen is het belangrijk dat u voldoende drinkt, 2 glazen water voor en 2 glazen water na de behandeling.

Voor een juiste werking is het belangrijk dat u voldoende calcium en vitamine D inneemt, zoals door uw behandelend arts voorgeschreven.

Voordat u een behandeling krijgt, zal uw arts eerst uw bloed controleren.

Wat moet er gebeuren voordat u Zoledroninezuur kunt krijgen?

Alvorens u kunt starten met Zoledroninezuur is het belangrijk uw nierfunctie in het bloed te controleren.

Neem contact op met uw arts indien u de dagen voorafgaand aan het infuus:

- hoge koorts heeft gehad
- diarree of een andere aandoening met vochtverlies heeft gehad
- andere medicatie bent gaan gebruiken.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen

Over het algemeen kunt u Zoledroninezuur in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Het advies is om zoals bij elke medicatie altijd uw huisarts, uw tandarts en uw specialist te informeren welke geneesmiddelen u gebruikt

Mogelijke bijwerkingen/ Allergische reacties;

Zoals bij elk ander medicijn dat (per infuus) gegeven wordt, zijn er ook bij Zoledroninezuur reacties tijdens of na het infuus mogelijk.

Griepachtige klachten komen na het eerste infuus vaak voor (bij meer dan dertig procent van de patiënten), maar bij het volgende infuus gewoonlijk in mindere mate.

Deze klachten kunnen bestaan uit koorts en rillingen, pijn in spieren en gewrichten en hoofdpijn. Deze klachten zijn meestal mild tot matig en kunnen enkele dagen aanhouden.

Zo nodig kunt u Paracetamol 500mg gebruiken bij deze klachten.

Er zijn andere, minder vaak voorkomende bijwerkingen mogelijk. Als u onbegrepen klachten hebt, of twijfelt over bijwerkingen, neem dan altijd contact op met de osteoporosepoli (poli geriatrie)

Als u eerder klachten van een onregelmatig hartritme heeft gehad, meldt dit dan aan uw behandelend arts van de osteoporose polikliniek.

Controles

Drie maanden na het eerste infuus vindt een controle naar bijwerkingen plaats en controle bloedonderzoek; u krijgt een afspraak thuis gestuurd.

Vragen

Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op;

Hoorn:

Dagcentrum: 0299-457995

Polikliniek interne: 0229-257823

Polikliniek geriatrie: 0229-257429

Purmerend:

Dagcentrum: 0299-457995

Polikliniek interne: 0299-457148

Eurocept Homecare: 030-2804271

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-01464-NL 21-11-2022