

Titel:	Toedieninformatie thuiszorg: ceftriaxon
Documentnummer	-
Versienummer	3
Locatie	Purmerend én Hoorn

Toepassingsgebied

Hoorn én Purmerend (voor thuiszorgmedewerkers in de regio)

Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)

Het geneesmiddel is al voor toediening gereed gemaakt (VTGM) door de klinische farmacie van het Dijklander Ziekenhuis.

Gebruikte hulpmiddelen bij VTGM (t.b.v. declaraties openbare apotheek)

- Ceftriaxon Hikma 2g (qs)
- NaCl 0,9% flacon 100ml (20ml per flacon ceftriaxon)
- NaCl 0,9% 100ml infuuszak (qs) ZI: 15111245

Generieke naam

Ceftriaxon 2000 - 4000mg

Merknaam/synoniem

Rocephin®

Afleveringsvorm

Ceftriaxon wordt als infuuszak geleverd voor intraveneuze infusie.

Ceftriaxon infuuszak

Dosering	Oplosmiddel	Volume
2000 - 4000 mg	NaCl 0,9%	Toegevoegd aan 100ml

Wordt geleverd met:

- Omniflush spuiten 10ml NaCl 0,9% (om te flushen).
- Chloorhexidine 0,5% in ethanol 70% (om de huid te desinfecteren voor het aanprikken van het infuus).
- Heparine 100IE/ml 5 ml ampul (om te flushen bij kortlopend infuus).

Toedienen

Ceftriaxon

Toedienroute	Toedientijd	Bijzonderheden
Intraveneus	In 30 minuten of 24 uur (als continu infuus)	-

Aandachtspunten

- Ceftriaxon kan overgevoeligheidsreacties veroorzaken.

Houdbaarheid / bewaarcondities

Ceftriaxon

Houdbaarheid	Bewaarcodities
--------------	----------------

Dit document is 24 uur geldig na het printen op: woensdag 6 maart 2024, 12:11

14 dagen (datum op etiket)	Gekoeld bewaren
----------------------------	-----------------

* Houdbaarheid is inclusief 24 uur bij kamertemperatuur.

Verenigbaar met

In hetzelfde infuus: lidocaïne 1%, metronidazol.

Over dezelfde lijn: aciclovir, allopurinol, amiodaron, anidulafungine, bivalirudine, cisatracurium, daptomycine, diltiazem, foscarnet, granisetron, morfine, pethidine, propofol, remifentanil, tigecycline, zidovudine

+ alle stoffen genoemd bij "in hetzelfde infuus".

Onverenigbaar met

Amikacine, azitromycine, calcium-verbindingen (bijvoorbeeld Ringerlactaat), caspofungine, clindamycine, filgrastim, fluconazol, gentamicine, pentamidine, theofylline, tobramycine, vancomycine.

Bijzonderheden

- Kruisovergevoeligheid en -resistentie met andere cefalosporines en penicillines is gemeld.
- Bevat per 1000 mg ceftriaxon 3,6 mmol natrium.