



# CETROTIDE GEBRUIKSAANWIJZING

➔ 0,25 milligram ➔



Start



# INHOUD



Hoe gebruikt u Cetrotide? ..... 02

Voordat u begint ..... 03

Het poeder en het water mengen ..... 04

Cetrotide injecteren ..... 06

Hoe bewaart u Cetrotide? ..... 08





# HOE GEBRUIKT U CETROTIDE?



Lees voordat u Cetrotide gebruikt deze instructies eerst volledig door.



Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.



Dit geneesmiddel is uitsluitend voor u bedoeld - voorkom dat iemand anders het gebruikt.



Gebruik elke naald, injectieflacon en injectiespuit slechts eenmaal.



Dit geneesmiddel is uitsluitend bestemd voor onderhuidse injectie in de buik (subcutaan).



De eerste injectie moet onder toezicht van uw arts worden toegediend. Uw arts of de verpleegkundige zal u laten zien hoe het geneesmiddel wordt bereid en geïnjecteerd. De volgende injecties mag u zelf toedienen.



De inhoud van 1 injectieflacon (0,25 mg Cetrotide) moet eenmaal daags worden toegediend. Het geneesmiddel wordt bij voorkeur dagelijks op hetzelfde tijdstip geïnjecteerd, met een periode van 24 uur tussen elke dosis. U kunt ervoor kiezen elke ochtend of elke avond de injectie toe te dienen.



Deze folder vervangt de bijsluiter niet. In de bijsluiter vindt u uitgebreidere informatie over het gebruik van Cetrotide.



Indien u nog vragen heeft, kunt u deze aan uw arts of apotheker stellen.





VOORDAT U BEGINT



DIT PRODUCT MOET VOOR INJECTIE OP KAMERTEMPERATUUR ZIJN

Ongeveer 30 minuten vóór gebruik uit de koelkast nemen.

WAS UW HANDEN

Het is belangrijk dat uw handen en alles wat u verder gebruikt, zo schoon mogelijk zijn.

LEG OP EEN SCHOON OPPERVLAK ALLES GEREED WAT U NODIG HEEFT

- 1 injectieflacon met poeder
- 1 spuit voorgevuld met steriel water (oplosmiddel)
- 1 gele injectienaald
- 1 grijze injectienaald
- 2 alcoholgaasjes



# HET POEDER EN HET WATER MENGEN

## HET VERWIJDEREN VAN HET PLASTIC DOPJE VAN DE INJECTIEFLACON

- Verwijder het plastic dopje van de injectieflacon
- Er zit een rubberen stop onder - laat deze in de injectieflacon zitten.
- Neem de aluminiumring en de rubberen stop af met een alcoholgaasje.

1



2

## HET WATER UIT DE VOORGEVULDE SPUIT TOEVOEGEN AAN HET POEDER IN DE INJECTIEFLACON


- Haal de gele injectienaald uit de verpakking.
- Neem de dop van de voorgevulde spuit en schroef de gele naald erop. Verwijder de huls van de naald.
- Druk de gele naald door het midden van de rubberen stop van de injectieflacon.

- Injecteer het water in de injectieflacon door langzaam op de zuiger van de spuit te drukken. Gebruik geen ander water.
- Laat de spuit in de rubberen stop zitten.

3

### HET POEDER EN HET WATER IN DE INJECTIEFLACON MENGEN

- Houd de spuit en de injectieflacon goed vast en beweeg deze zachtjes heen en weer om het poeder en het water te mengen. Na het mengen is de oplossing helder zonder deeltjes.
- Niet schudden, hierdoor ontstaan luchtbelllen in het geneesmiddel.



4

### DE INJECTIESPUIT OPNIEUW VULLEN MET HET GENEESMIDDEL UIT DE INJECTIEFLACON

- Houd de injectieflacon ondersteboven.
- Trek dan de zuiger voorzichtig terug, om het geneesmiddel uit de injectieflacon in de spuit op te zuigen. Zorg ervoor dat u de zuiger met het rubberen afsluitdopje niet helemaal uit de spuit trekt. Als u de zuiger met het rubberen afsluitdopje per ongeluk uit de spuit heeft getrokken, gooi de dosis dan in elk geval weg omdat hij niet meer steriel is, en bereid een nieuwe dosis (begin weer bij stap 1).
- Als er oplossing achterblijft in de injectieflacon, trek dan de gele naald naar buiten tot het uiteinde van de naald zich net in de rubberen stop bevindt. Als u van de zijkant door de opening in de rubberen stop kijkt, kunt u de beweging van de naald en de vloeistof volgen.
- Zorg ervoor dat al het geneesmiddel uit de injectieflacon wordt opgezogen.
- Plaats de dop terug op de gele naald. Schroef de gele naald los van de injectiespuit en leg de injectiespuit weg.



# CETROTIDE INJECTEREN

## 5 LUCHTBELLEN VERWIJDEREN



- Haal de grijze naald uit de verpakking. Schroef de grijze naald op de spuit en verwijder de huls.
- Houd de spuit met de grijze naald naar boven gericht en controleer of er luchtbelletjes in zitten.
- Eventuele luchtbelletjes worden verwijderd door zachtjes tegen de spuit te tikken tot alle luchtbelletjes zich bovenin bevinden - druk vervolgens langzaam op de zuiger tot alle luchtbelletjes zijn verdwenen.
- Raak de grijze naald niet aan en zorg dat de naald nergens mee in aanraking komt.

## DE INJECTIEPLAATS REINIGEN

- Kies voor de injectie een plaats op de buik, bij voorkeur rond de navel. Huidirritatie wordt voorkomen door elke dag een andere injectieplaats te kiezen.
- Reinig de huid bij de injectieplaats met het tweede alcoholgaasje - maak een draaiende beweging.

6



## DE HUID AANPRIJKEN

- Houd de spuit in één hand vast - zoals u een pen vasthoudt.
- Knijp met de andere hand de huid rondom de plaats waar u wilt injecteren zachtjes samen en houd de huidplooi stevig vast.
- Druk de grijze naald langzaam volledig in de huid onder een hoek van 45 tot 90 graden - laat dan de huidplooi los.


7



## HET GENEESMIDDEL INJECTEREN

- Trek de zuiger van de spuit zachtjes terug. Als er bloed zichtbaar wordt, ga dan verder met stap 9 hieronder.
- Als er geen bloed zichtbaar wordt, druk dan de zuiger langzaam verder om het middel te injecteren.
- Wanneer de spuit leeg is, trekt u de grijze naald langzaam en onder dezelfde hoek terug uit de huid.
- Gebruik het tweede alcoholgaasje om zachtjes druk uit te oefenen op de plaats waar u zojuist heeft geïnjecteerd.
- Nu mag stap 9 worden overgeslagen.

8



9

### ALS ER BLOED ZICHTBAAR WORDT

- Trek de grijze naald langzaam en onder dezelfde hoek terug uit de huid
  - Gebruik het tweede alcoholgaasje om zachtjes druk uit te oefenen op de plaats waar u zojuist de huid heeft aangeprikt
- Leeg de spuit in de gootsteen en ga verder met stap 10 hieronder
  - Was uw handen en begin opnieuw met een nieuwe injectieflacon en voorgevulde injectiespuit



10

### AFVOER

- Gebruik elke naald, injectieflacon en injectiespuit slechts eenmaal.
- Plaats de huls terug over de naalden zodat ze veilig kunnen worden weggegooid.
- Vraag uw apotheker hoe u de gebruikte naalden, injectieflacons en spuiten veilig kunt afvoeren.







# HOE BEWAART U CETROTIDE?



Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.



Het poeder in de injectieflacon en het steriele water (oplosmiddel) in de voorgevulde spuit hebben dezelfde uiterste houdbaarheidsdatum. Gebruik Cetrotide niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de injectieflacon na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.



Bewaren in de koelkast (2°C - 8°C). Het ongeopende product kan in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard bij kamertemperatuur (beneden 30°C) gedurende maximaal drie maanden.



De injectieflacon in de oorspronkelijke verpakking bewaren ter bescherming tegen licht.



Na bereiding moet de oplossing onmiddellijk worden toegediend.



Gebruik Cetrotide niet als het witte poeder in de flacon er anders uitziet.



Niet gebruiken als de bereide oplossing in de flacon niet helder en kleurloos is of deeltjes bevat.



Merck B.V.

Tupolevlaan 41-61

1119 NW Schiphol-Rijk

Tel: +31 (0)20 658 28 00

Fax: +31 (0)20 658 05 55

The Merck logo is displayed in a stylized, light blue font. It is positioned within a dark purple, irregularly shaped graphic element that resembles a speech bubble or a stylized 'M' shape, located in the bottom right corner of the page.