

# Instructiekaart (altijd meenemen!)

## IVF/ICSI – Agonist

Datum

Eerste menstruatie

\_\_\_\_\_

Inname anticonceptie (de pil)

\_\_\_\_\_

Start prikken Decapeptyl

\_\_\_\_\_

Laatste dag inname anticonceptie (de pil)

\_\_\_\_\_

Tweede menstruatie

\_\_\_\_\_

- ❖ Na het innemen van de laatste pil volgt een bloeding, dit is je tweede menstruatie. Meld dit nog dezelfde dag via een e-consult in *Mijn Dijklander*.
- ❖ Wij plannen dan voor jou een echo-afspraken in en geven de startdatum en de dosering van de Gonal-F/Menopur\* door via een e-consult.
- ❖ De Decapeptyl blijf je doorprikken (1x daags 1 injectie). Het advies is om de injecties 's avonds te prikken op een zelfgekozen vast tijdstip.

\* Je gebruikt één van de twee genoemde medicijnen.

Datum														
Cyclusdag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Echo-afpraak														
Decapeptyl														
Gonal-F/ Menopur														

Datum														
Cyclusdag	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Echo-afpraak														
Decapeptyl														
Gonal-F/ Menopur														

# Afspraken rondom punctie

	Datum	Tijd
Stop Decapeptyl en Gonal-F/Menopur*	_____	_____
Ovitrelle prikken (6500 IE = 250 ug)	_____	_____
Inname Paracetamol en Diclofenac	_____	_____
Inleveren zaad	_____	_____
Inname Dormicum (Je krijgt deze in het Cvk)	_____	_____
<b>Punctie</b>	_____	_____
Start Utrogestan 200 mg (3 maal daags 1 capsule vaginaal inbrengen)	_____	_____
Zwangerschapstest 18 dagen na punctie (middels een bloedtest)	_____	_____

Vóór 9.00 uur prikken, uitslag volgt na 15.00 uur

Voor het aanmelden van een nieuwe cyclus, recept of vragen, kun je een e-consult sturen via *Mijn Dijklander*.