

Toedieninformatie thuiszorg: Bupivacaine 2,5 mg/ml (Versie 1)

Toepassingsgebied

Hoorn én Purmerend (voor thuiszorgmedewerkers in de regio).

Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)

Het geneesmiddel is al voor toediening gereed gemaakt (VTGM) door de klinische farmacie van het Dijklander Ziekenhuis.

Gebruikte hulpmiddelen bij VTGM (t.b.v. declaraties openbare apotheek)

- Bupivacaine aurobindo injvst 2,5mg/ml flac 50ml (5 stuks), ZI: 15399737
- EVA zak 250ml

Generieke naam

Bupivacaine 2,5 mg/ml

Merknaam/synoniem

Marcaine®

Afleveringsvorm

Bupivacaine wordt als infuuszak geleverd voor intraveneuze toediening.

Bupivacaine infuuszak

Dosering	Oplosmiddel	Volume
625mg	NaCl 0,9%	250 ml

Toedienen

Bupivacaine

Toedienroute	Inloopsnelheid
Epiduraal	4-7,5 ml/uur

Aandachtspunten

- Acute reacties: anafylactische reacties zijn waargenomen.

Houdbaarheid / bewaarcondities

Bupivacaine

Infuus	Houdbaarheid	Bewaarcondities
2,5 mg/ml	30 dagen (datum op etiket)	Koelkast (2-8 °C)

Na aansluiten 7 dagen houdbaar bij kamertemperatuur.

Verenigbaar met

In hetzelfde infuus: morfine, sufentanil

Onverenigbaar met

Vanwege de epidurale toediening van bupivacaïne niet combineren met alle overige geneesmiddelen.

Bijzonderheden

- Bupivacaïne alleen epiduraal, perineuraal of intrathecaal toepassen, nooit intraveneus toedienen.
- De werking treedt na 15-30 minuten in.
- Door langdurig contact van de bupivacaïneoplossing met metalen, bijvoorbeeld naalden, kan zwelling op de injectieplaats voorkomen.