

# Toedieninformatie thuiszorg: Bupivacaïne/Sufentanil 1,25 mg/1 microg/ml (Versie 1)

## Toepassingsgebied

Hoorn én Purmerend (voor thuiszorgmedewerkers in de regio).

## Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)

Het geneesmiddel is al voor toediening gereed gemaakt (VTGM) door de klinische farmacie van het Dijklander Ziekenhuis.

Gebruikte hulpmiddelen bij VTGM (t.b.v. declaraties openbare apotheek):

- Bupivacaïne 1,25 mg/ml 50 ml inf.vlst. SAHZ,(qs) ZI: 16223942
- Sufentanil Forte inj.vlst.50 microg/ml 1 ml amp. ZI: 13289438
- EVA zak 250 ml (Baxter) ZI: 15212254

## Generieke naam

Bupivacaïne/Sufentanil 1,25mg/1microg/ml

## Afleveringsvorm

Bupivacaïne/Sufentanil wordt als infuuszak geleverd voor epidurale toediening.

### Bupivacaïne/Sufentanil infuuszak

Dosering	Oplosmiddel	Volume
312,5 mg Bupivacaïne 250 microg Sufentanil	NaCl 0,9%	250 ml

## Toedienen

Toedienroute	Toedientijd
Epiduraal	Continu infuus (na aansluiten 7 dagen houdbaar bij kamertemperatuur) Toediensnelheid in overleg met arts.

### Aandachtspunten

- Acute reacties: anafylactische reacties zijn waargenomen.

### Toedienen via infuuspomp

Eindconcentratie is: Bupivacaïne 1,25 mg/ml + Sufentanil 1 microg/ml				
ml/uur	Sufentanil microg/uur	Bupivacaïne mg/uur	Sufentanil microg/24 uur	Bupivacaïne mg/24 uur
2	2	2,5	48	60
3	3	3,75	72	90
4	4	5	96	120
5	5	6,25	120	150
6	6	7,5	144	180
7	7	8,75	168	210
8	8	10	192	240

9	9	11,25	216	270
10	10	12,5	240	300

## Houdbaarheid / bewaarcondities

Infuus	Houdbaarheid	Bewaarcondities
1,25 mg/1 microg/ml	14 dagen (datum op etiket)	Koelkast (2-8 °C)

## Verenigbaar met

Vanwege de epidurale toepassing van Bupivacaïne/Sufentanil dit product niet combineren met andere geneesmiddelen.

## Onverenigbaar met

Vanwege de epidurale toepassing van Bupivacaïne/Sufentanil dit product niet combineren met andere geneesmiddelen.

## Bijzonderheden

- De pH van de Bupivacaïne injectievloeistof is 3,5-5,0.