

Toedieninformatie thuiszorg: Micafungine (Versie 2)

Toepassingsgebied

Hoorn én Purmerend (voor thuiszorgmedewerkers in de regio)

Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)

Het geneesmiddel is al voor toediening gereed gemaakt (VTGM) door de klinische farmacie van het Dijklander Ziekenhuis.

Gebruikte hulpmiddelen bij VTGM (t.b.v. declaraties openbare apotheek)

- Mycamine infusiepoeder flacon 100mg (ZI: 16945492)
- NaCl 0,9% flacon 100ml
- NaCl 0,9% 100ml infuuszak (qs), ZI: 15111245

Generieke naam

Micafungine (100mg - 200mg)

Merknaam/synoniem

Mycamine®

Afleveringsvorm

Micafungine wordt als infuuszak (in een UV werende omzak) geleverd voor intraveneuze toediening.

Micafungine infuuszak

Dosering	Oplosmiddel	Volume
100 mg - 200 mg	NaCl 0,9%	Toegevoegd aan 100 ml

Wordt geleverd met:

- Omniflush spuit 10ml NaCl 0,9% (om te flushen).
- Chloorhexidine 0,5% in ethanol 70% (om de huid te desinfecteren voor het aanprikken van het infuus).

Toedienen

Micafungine

Toedienroute	Toedientijd	Bijzonderheden
Intraveneus	60 minuten	n.v.t.

Aandachtspunten

- De oplossing via een intraveneus infuus in circa 1 uur toedienen. Bij een snellere toediensnelheid is er meer kans op histamine-gemedieerde reacties.
- Schudden veroorzaakt schuimvorming.

Houdbaarheid / bewaarcondities

Micafungine

Houdbaarheid	Bewaarcondities
4 dagen* (datum op etiket)	In DONKER en KOELKAST (2-8 °C) bewaren

* de houdbaarheidsduur is inclusief de toedientijd.

Verenigbaar met

In hetzelfde infuus: n.v.t.

Over dezelfde lijn: Bumetanide, calciumchloride, calciumgluconaat, dopamine, furosemide, heparine, hydromorfon, lidocaïne, lorazepam, magnesiumsulfaat, nitroglycerine, kaliumchloride, natriumfosfaat, tacrolimus, theofylline, vasopressine.

Onverenigbaar met

Adrenaline, albumine, amiodaron, diltiazem, dobutamine, insuline, labetalol, midazolam, morfine(sulfaat), mycofenolzuur, ondansetron, fenytoïne, rocuronium.

Voor alle overige geneesmiddelen die hier niet zijn genoemd, geldt in principe dat deze onverenigbaar zijn met micafungine. Eventueel kan contact worden opgenomen met de dagapotheeker.

Bijzonderheden

- Kruisresistentie voor andere echinocandinen is niet uitgesloten.
- De infuuszakken worden beschermd tegen invloeden van licht met een lichtwerende omzak.