

## Toedieninformatie thuiszorg: Morfine/dexamethason (Versie 2)

### Toepassingsgebied

Hoorn én Purmerend (voor thuiszorgmedewerkers in de regio)

### Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)

Het geneesmiddel is al voor toediening gereed gemaakt (VTGM) door de klinische farmacie van het Dijklander Ziekenhuis.

Gebruikte hulpmiddelen bij VTGM (t.b.v. declaraties openbare apotheek)

- Morfine 10mg/ml 10ml ampul: 100 ml bij 1000/4 mg; 1000/8 mg en 1000/16 mg cassettes. ZI: 14065541
- Morfine 20mg/ml 5ml ampul: 100 ml bij 2000/4 mg; 2000/8 mg en 2000/16 mg cassettes. ZI: 13995618
- Dexamethason CF injectievloeistof 4 mg/ml 1 ml ampul (qs). ZI: 15607941
- Deltec CADD medicatiecassette 100ml flowstop, ZI: 16196155

### Generieke naam

Morfine/dexamethason

### Merknaam/synoniem

Geen geregistreerde merknaam

### Afleveringsvorm

Morfine/dexamethason cassette

Dosering	Oplosmiddel	Volume
1000/4 mg/ml	n.v.t.	100 mL
1000/8 mg/ml	n.v.t.	100 mL
1000/16 mg/ml	n.v.t.	100 mL
2000/2 mg/ml	n.v.t.	100 mL
2000/4 mg/ml	n.v.t.	100 mL
2000/8 mg/ml	n.v.t.	100 mL

### Toedienen

Morfine/dexamethason

Toedienroute	Toedientijd
Subcutaan	Op voorschrift huisarts (continu infuus)

### Houdbaarheid / bewaarcondities

Houdbaarheid	Bewaarcodities
14 dagen* (datum op etiket)	Gekoeld bewaren (2-8 °C)

\* De houdbaarheidsdatum is inclusief 7 dagen bij kamertemperatuur na aansluiten en inclusief toedientijd.

### Verenigbaar met

In hetzelfde infuus: metoclopramide, ondansetron, ranitidine

Over dezelfde lijn: allopurinol, anidulafungine, amikacine, bivalirudine, cisatracurium, filgrastim, fluconazol, foscarnet, granisetron, heparine, kaliumchloride, lidocaïne, linezolid, piperacilline-tazobactam, remifentanil

+ alle stoffen genoemd bij "in hetzelfde infuus"

## Onverenigbaar met

Ciprofloxacin, doxapram, fenytoïne, flucloxaciline, haloperidol, hydromorfon, micafungine, midazolam, pantoprazol, pethidine, promethazine, propofol, theofylline, thiopental.

Voor alle geneesmiddelen die hier niet zijn genoemd, geldt in principe dat deze onverenigbaar zijn met morfine/dexamethason. Eventueel kan contact worden opgenomen met de dagapotheker.

## Bijzonderheden

- Acute reacties: overgevoelighedsreacties en anafylactische reacties zijn waargenomen.
- Herhaalde subcutane injecties kunnen weefselirritatie en pijn veroorzaken.