

## Toedieninformatie thuiszorg: Pantoprazol (Versie 2)

### Toepassingsgebied

Hoorn en Purmerend (voor thuiszorgmedewerkers in de regio)

### Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)

Het geneesmiddel is al voor toediening gereed gemaakt (VTGM) door de Klinische Farmacie van het Dijklander Ziekenhuis.

Gebruikte hulpmiddelen bij VTGM (t.b.v. declaraties openbare apotheek)

- Pantoprazol Sun Pharma injpdr flacon 40 mg, ZI: 16519175
- NaCl 0,9% flacon 100ml
- NaCl 0,9% 50ml infuuszak (qs), ZI: 15111237 of 100ml, ZI: 15111245

### Generieke naam

**Pantoprazol (40-80 mg)**

### Merknaam/synoniem

Pantoprazol

### Afleveringsvorm

Pantoprazol wordt als infuuszak geleverd voor intraveneuze toediening.

#### Pantoprazol infuuszak

Dosering	Oplosmiddel	Volume
40 mg	NaCl 0,9%	Toegevoegd aan 50 ml
80 mg	NaCl 0,9%	Toegevoegd aan 100 ml

Wordt geleverd met:

- Omniflush spuit 10ml NaCl 0,9% (om te flushen).
- NaCl 0,9% 50ml infuuszak (om te flushen).
- Chloorhexidine 0,5% in ethanol 70% (om de huid te desinfecteren voor het aanprikken van het infuus).

Pantoprazol iv kan thuis ook toegediend worden door een geïnstrueerde mantelzorger. Er wordt dan geen kant en klaar infuus geleverd maar Pantoprazol iv flacons via de Maelsonapotheek.

### Toedienen

#### Pantoprazol

Toedienroute	Toedientijd	Bijzonderheden
Intraveneus	15 min	Voor toediening langzaam op kamertemperatuur laten komen

#### Aandachtspunten

- Acute reacties: anafylactische reacties en angio-oedeem zijn waargenomen.

## Houdbaarheid / bewaarcondities

### Pantoprazol

Houdbaarheid	Bewaarcondities
14 dagen* (datum op etiket)	Koelkast (2-8°C)

\* de houdbaarheidsduur is inclusief de toedientijd.

## Verenigbaar met

Voor alle geneesmiddelen geldt dat deze ONverenigbaar zijn met pantoprazol.

## Onverenigbaar met

Voor alle geneesmiddelen geldt dat deze ONverenigbaar zijn met pantoprazol.

## Bijzonderheden

- Pantoprazol i.v. niet toepassen bij kinderen wegens onvoldoende ervaring (veiligheid en werkzaamheid in kinderen <18 jaar niet vastgesteld).
- Het gebruik van pantoprazol wordt afgeraden bij patiënten met levercirrose wegens een sterk verhoogde blootstelling.
- De pantozoloplossing heeft een pH van 9-9,5.