

Toedieninformatie thuiszorg: cefazoline (Versie 3)

Toepassingsgebied

Hoorn én Purmerend (voor thuiszorgmedewerkers in de regio)

Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)

Het geneesmiddel is al voor toediening gereed gemaakt (VTGM) door de klinische farmacie van het Dijklander Ziekenhuis.

Gebruikte hulpmiddelen bij VTGM (t.b.v. declaraties openbare apotheek)

- Cefazoline (Kefzol) 1000mg (qs)
- Water voor injectie flacon 100ml (4 ml per flacon cefazoline)
- NaCl 0,9% 250 ml infuuszak (qs),ZI: 15111253

Generieke naam

Cefazoline 3000 - 8000mg

Merknaam/synoniem

Kefzol®

Afleveringsvorm

Cefazoline wordt als infuuszak geleverd voor intraveneuze infusie.

Cefazoline infuuszak

Dosering	Oplosmiddel	Volume
3000 - 8000mg	NaCl 0,9%	Toegevoegd aan 250ml

Wordt geleverd met:

- Omniflush spuit 10ml NaCl 0,9% (om te flushen).
- Chloorhexidine 0,5% in ethanol 70% (om de huid te reinigen voor het aanprikken van het infuus).

Toedienen

Cefazoline

Toedienroute	Toedientijd	Bijzonderheden
Intraveneus	24 uur (als continu infuus)	-

Aandachtspunten

- Cefazoline kan overgevoeligheidsreacties veroorzaken.

Houdbaarheid / bewaarcondities

Cefazoline

Houdbaarheid	Bewaarcodities
14 dagen* (datum op etiket)	Gekoeld bewaren

* Houdbaarheid is inclusief 24 uur bij kamertemperatuur (voor het aanhangen).

Verenigbaar met

In hetzelfde infuus: Clindamycine, heparine, linezolid, metronidazol, pethidine, verapamil.

Over dezelfde lijn: Aciclovir, allopurinol, anidulafungine, atracurium, bivalirudine, calciumgluconaat, dexmedetomidine, esmolol, filgrastim, fluconazol, foscarnet, granisetron, hydroxyethylzetmeel, insuline, labetalol, lidocaïne, magnesiumsulfaat, morfine, ondansetron, palonosetron, pancuronium, propofol, ranitidine, remifentanil, vecuronium
+ alle stoffen genoemd bij "in hetzelfde infuus".

Onverenigbaar met

Caspofungine, erytromycine, pentamidine.

Voor alle overige geneesmiddelen die hier niet zijn genoemd, geldt in principe dat deze onverenigbaar zijn met cefazoline.

Bijzonderheden

- Kruisovergevoeligheid en -resistentie met andere cefalosporines en penicillines is gemeld.
- Bevat 2,1 mmol natrium per 1000 mg.