

Toedieninformatie thuiszorg: ceftazidim (Versie 2)

Toepassingsgebied

Hoorn én Purmerend (voor thuiszorgmedewerkers in de regio)

Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)

Het geneesmiddel is al voor toediening gereed gemaakt (VTGM) door de klinische farmacie van het Dijklander Ziekenhuis.

Gebruikte hulpmiddelen bij VTGM (t.b.v. declaraties openbare apotheek)

- Ceftazidim Fresenius Kabi 2g (qs)
- NaCl 0,9% flacon 100ml (19ml per flacon ceftazidim)
- NaCl 0,9% 100ml (ZI: 15111245), NaCl 0,9% 250ml (ZI-nummer: 15111253) of NaCl 0,9% 500ml (ZI-nummer: 15111261) (afhankelijk van dosering, zie hieronder) (qs)

Generieke naam

Ceftazidim 1000 - 12000mg

Merknaam/synoniem

Fortum®

Afleveringsvorm

Ceftazidim wordt als infuuszak geleverd voor intraveneuze infusie.

Ceftazidim infuuszak

Dosering	Oplosmiddel	Volume
1000 - 10000mg	NaCl 0,9%	Toegevoegd aan 250ml
10000 - 12000mg	NaCl 0,9%	Toegevoegd aan 500ml

Wordt geleverd met:

- Omniflush spuit 10ml NaCl 0,9% (om te flushen).
- Chloorhexidine 0,5% in ethanol 70% (om de huid te reinigen voor het aanprikken van het infuus).

Toedienen

Ceftazidim

Toedienroute	Toedientijd	Bijzonderheden
Intraveneus	24 uur (als continu infuus)	-

Aandachtspunten

- Cefatazidim kan overgevoelighedsreacties veroorzaken.

Houdbaarheid / bewaarcondities

Ceftazidim

Houdbaarheid	Bewaarcodities
7 dagen* (datum op etiket)	Gekoeld bewaren

* Houdbaarheid is inclusief 24 uur bij kamertemperatuur (voor het aanhangen).

Verenigbaar met

In hetzelfde infuus: clindamycine, flucloxacilline, hydromorfon, linezolid, metronidazol

Over dezelfde lijn: aciclovir, adrenaline, allopurinol, anidulafungine, bivalirudine, ciprofloxacin, daptomycine, enalapril, esmolol, filgrastim, foscarnet, granisetron, heparine, hydroxyethylzetmeel, labetalol, morfine, ondansetron, pethidine, ranitidine, tacrolimus, tigecycline, tobramycine, zidovudine
+ alle stoffen genoemd bij "in hetzelfde infuus".

Onverenigbaar met

Amfotericine B, amikacine, amiodaron, calciumzouten, caspofungine, claritromycine, erytromycine, fenytoïne, fluconazol, gentamicine, midazolam, natriumbicarbonaat, nicardipine, pantoprazol, propofol, theofylline, vancomycine.

Bijzonderheden

- Kruisovergevoeligheid en -resistentie met andere cefalosporines en penicillines is gemeld.
- Bevat per 1000 mg ceftazidim 2,3 mmol natrium.