

## Toedieninformatie thuiszorg: flucloxacilline (Versie 3)

### Toepassingsgebied

Hoorn én Purmerend (voor thuiszorgmedewerkers in de regio)

### Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)

Het geneesmiddel is al voor toediening gereed gemaakt (VTGM) door de klinische farmacie van het Dijklander Ziekenhuis.

Gebruikte hulpmiddelen bij VTGM (t.b.v. declaraties openbare apotheek)

- Flucloxacilline Aurobindo 2g (qs)
- Water voor injectie flacon 100ml (20ml per flacon flucloxacilline)
- NaCl 0,9% 250ml infuuszak (qs), ZI: 15111253

### Generieke naam

**Flucloxacilline (3000 - 12000mg)**

### Merknaam/synoniem

Floxapen®

### Afleveringsvorm

Flucloxacilline wordt als infuuszak geleverd voor intraveneuze toediening.

#### Flucloxacilline infuuszak

Dosering	Oplosmiddel	Volume
3000 - 12000mg	NaCl 0,9%	Toegevoegd aan 250 ml

Wordt geleverd met:

- Omniflush spuit 10ml NaCl 0,9% (om te flushen).
- Chloorhexidine 0,5% in ethanol 70% (om de huid te desinfecteren voor het aanprikken van het infuus).

### Toedienen

#### Flucloxacilline

Toedienroute	Toedientijd	Bijzonderheden
Intraveneus	24 uur (als continu infuus)	Gekoeld toedienen

#### Aandachtspunten

- Gekoeld toedienen
- Intraveneuze toediening geeft vaak aanleiding tot irritatie of flebitis. Toediening via een groot/centraal bloedvat verdient daarom de voorkeur.
- Acute reacties: anafylactische reacties zijn waargenomen.

### Houdbaarheid / bewaarcondities

#### Flucloxacilline

Houdbaarheid	Bewaarcondities
7 dagen* (datum op etiket)	Gekoeld bewaren en toedienen

\* de houdbaarheidsduur is inclusief de toedientijd.

## Verenigbaar met

**In hetzelfde infuus:** adrenaline, bumetanide, butylscopolamine, ceftazidim, cefuroxim, dexamethason, digoxine, heparine, hydrocortison, isoprenaline, isosorbidedinitraat, lidocaïne, metronidazol, piperacilline, ranitidine.

**Over dezelfde lijn:** kaliumchloride  
+ alle stoffen genoemd bij "in hetzelfde infuus".

## Onverenigbaar met

Amikacine, amiodaron, atropine, buprenorfine, calciumgluconaat, ciprofloxacin, claritromycine, diazepam, dobutamine, erytromycine, gentamicine, lorazepam, metoclopramide, midazolam, morfine, pethidine, promethazine, tobramycine, verapamil.

Voor alle overige geneesmiddelen die hier niet zijn genoemd, geldt in principe dat deze onverenigbaar zijn met flucloxacilline.

## Bijzonderheden

- Kruisallergie en -resistentie met andere penicillines en cefalosporines is gemeld.
- Bevat per 1000 mg flucloxacilline 2,2 mmol natrium.