Toedieninformatie thuiszorg: flucloxacilline (Versie 4)

Toepassingsgebied

Hoorn én Purmerend (voor thuiszorgmedewerkers in de regio)

Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)

Het geneesmiddel is al voor toediening gereed gemaakt (VTGM) door de klinische farmacie van het Dijklander Ziekenhuis.

Gebruikte hulpmiddelen bij VTGM (t.b.v. declaraties openbare apotheek)

- Flucloxacilline Aurobindo 2g (qs)
- Water voor injectie flacon 100ml (20ml per flacon flucloxacilline)
- NaCl 0,9% 250ml infuuszak (qs), ZI: 15111253

Generieke naam

Flucloxacilline (3000 - 12000mg)

Merknaam/synoniem

Floxapen®

Afleveringsvorm

Flucloxacilline wordt als infuuszak geleverd voor intraveneuze toediening.

Flucloxacilline infuuszak

Dosering	Oplosmiddel	Volume
3000 - 12000mg	NaCl 0,9%	Toegevoegd aan 250 ml

Wordt geleverd met:

- Omniflush spuiten 10ml NaCl 0,9% (om te flushen).

Toedienen

Flucloxacilline

Toedienroute	Toedientijd	Bijzonderheden
Intraveneus	24 uur (als continu infuus)	Gekoeld toedienen

Aandachtspunten

- Gekoeld toedienen
- Intraveneuze toediening geeft vaak aanleiding tot irritatie of flebitis. Toediening via een groot/centraal bloedvat verdient daarom de voorkeur.
- Acute reacties: anafylactische reacties zijn waargenomen.

Houdbaarheid / bewaarcondities

Flucloxacilline

Houdbaarheid	Bewaarcondities
7 dagen* (datum op etiket)	Gekoeld bewaren en toedienen

* de houdbaarheidsduur is inclusief de toedientijd.

Verenigbaar met

In hetzelfde infuus: adrenaline, bumetanide, butylscopolamine, ceftazidim, cefuroxim, dexamethason, digoxine, heparine, hydrocortison, isoprenaline, isosorbidedinitraat, lidocaïne, metronidazol, piperacilline, ranitidine.

Over dezelfde lijn: kaliumchloride
+ alle stoffen genoemd bij “in hetzelfde infuus”.

Onverenigbaar met

Amikacine, amiodaron, atropine, buprenorfine, calciumgluconaat, ciprofloxacine, claritromycine, diazepam, dobutamine, erytromycine, gentamicine, lorazepam, metoclopramide, midazolam, morfine, pethidine, promethazine, tobramycine, verapamil.

Voor alle overige geneesmiddelen die hier niet zijn genoemd, geldt in principe dat deze onverenigbaar zijn met flucloxacilline.

Bijzonderheden

- Kruisallergie en -resistentie met andere penicillines en cefalosporines is gemeld.
- Bevat per 1000 mg flucloxacilline 2,2 mmol natrium.