

## Toedieninformatie thuiszorg: furosemide (Versie 4)

### Toepassingsgebied

Hoorn én Purmerend (voor thuiszorgmedewerkers in de regio)

### Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)

Het geneesmiddel is al voor toediening gereed gemaakt (VTGM) door de klinische farmacie van het Dijklander Ziekenhuis.

Gebruikte hulpmiddelen bij VTGM (t.b.v. declaraties openbare apotheek)

- Furosemide Sandoz 10mg/ml ampul 25ml (qs)
- Kortlopend/langlopend infuus: NaCl 0,9% 50ml infuuszak (qs), ZI: 15111237

### Generieke naam

**Furosemide 80 - 1000mg**

### Merksnaam/synoniem

Lasix®

### Afleveringsvorm

Furosemide wordt als infuuszak (in UV werende omzak) geleverd voor intraveneuze infusie.

#### Furosemide infuuszak

Dosering	Oplosmiddel	Volume
80 - 1000mg	NaCl 0,9%	Toegevoegd aan 50 ml

Let op bij hogere doseringen kan de totale volume van de infuuszak oplopen tot 148ml.

Wordt geleverd met:

- Omniflush spuit 10ml NaCl 0,9% (om te flushen).
- Chloorhexidine 0,5% in ethanol 70% (om de huid te desinfecteren voor het aanpakken van het infuus).

### Toedienen

#### Furosemide

Toedienroute	Toedientijd	Bijzonderheden
Intraveneus	Variabel. Langlopend met een infuuspomp of kortlopend als vrij lopend infuus. In beide gevallen maximaal 4 mg/min toedienen.	Maximale snelheid 4 mg/min

#### Aandachtspunten

- Acute reacties: overgevoeligheidsreacties zijn waargenomen.

### Houdbaarheid / bewaarcondities

#### Furosemide

Houdbaarheid	Bewaarcodities
30 dagen* (datum op etiket)	Gekoeld + donker bewaren

\* Na aansluiten 7 dagen houdbaar bij 25°C.

Bij bewaren in de koelkast kan een neerslag ontstaan. Dit lost weer op bij kamertemperatuur, zonder dat de stabiliteit van furosemide wordt beïnvloed.

## Verenigbaar met

**In hetzelfde infuus:** adrenaline, atropine, calciumgluconaat, cefuroxim, dexamethason, digoxine, heparine, isosorbidedinitraat, lidocaïne, natriumbicarbonaat, ranitidine, butylscopolamine, theofylline.

**Over dezelfde lijn:** allopurinol, amfotericine B, anidulafungine, argatroban, bivalirudine, ceftazidim, foscarnet, granisetron, hydrocortison, kaliumchloride, micafungine  
+ alle stoffen genoemd bij "in hetzelfde infuus".

## Onverenigbaar met

Amiodaron, ascorbinezuur, buprenorfine, caspofungine, ciprofloxacin, coffeïne, diazepam, diltiazem, dobutamine, dopamine, doxapram, droperidol, erytromycine, esmolol, fenylefrine, filgrastim, fluconazol, gentamicine, isoprenaline, labetalol, levofloxacin, metoclopramide, midazolam, milrinon, nicardipine, ondansetron, pethidine, pantoprazol, promethazine, vecuronium.

## Bijzonderheden

- Langdurige blootstelling aan licht kan verkleuring veroorzaken; geelgekleurde injectievloeistof niet gebruiken.
- De pH van furosemide injectievloeistof is 8,0-9,3.