

Toedieninformatie thuiszorg: meropenem (Versie 3)

Toepassingsgebied

Hoorn én Purmerend (voor thuiszorgmedewerkers in de regio)

Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)

Het geneesmiddel is al voor toediening gereed gemaakt (VTGM) door de klinische farmacie van het Dijklander Ziekenhuis.

Gebruikte hulpmiddelen bij VTGM (t.b.v. declaraties openbare apotheek)

- Meropenem Fresenius Kabi 1g (qs)
- NaCl 0,9% flacon 100ml (20ml per flacon meropenem)
- NaCl 0,9% 100ml (ZI: 15111245) of 250ml infuuszak (ZI: 15111253) (afhankelijk van dosering, zie tabel hieronder) (qs)

Generieke naam

Meropenem 1000 - 6000mg

Merknaam/synoniem

Meropenem®

Afleveringsvorm

Meropenem wordt als infuuszak geleverd voor intraveneuze infusie.

Meropenem infuuszak

Dosering	Oplosmiddel	Volume
1000 - 2500mg	NaCl 0,9%	Toegevoegd aan 100ml
2500 - 6000mg	NaCl 0,9%	Toegevoegd aan 250ml

Wordt geleverd met:

- Omniflush spuit 10ml NaCl 0,9% (om te flushen).
- Chloorhexidine 0,5% in ethanol 70% (om de huid te desinfecteren voor het aanprikken van het infuus).

Toedienen

Meropenem

Toedienroute	Toedientijd	Bijzonderheden
Intraveneus	24 uur (als continu infuus)	Gekoeld toedienen

Aandachtspunten

- Meropenem dient gekoeld te worden toegediend.
- Meropenem kan overgevoeligheidsreacties veroorzaken.

Houdbaarheid / bewaarcondities

Meropenem

Houdbaarheid	Bewaarcodities
5 dagen (datum op etiket)	Gekoeld bewaren en toedienen

Verenigbaar met

Over dezelfde lijn: anidulafungine, caspofungine, kaliumchloride, linezolid.

Onverenigbaar met

Aciclovir, amfotericine B, calciumgluconaat, diazepam, doxycycline, ondansetron, pantoprazol, zidovudine.

Bijzonderheden

- Kruisovergevoeligheid met andere carbapenem-antibiotica, cefalosporines en penicillines is gemeld.
- Bevat per 1000 mg meropenem 3,9 mmol natrium.