

## Toedieninformatie thuiszorg: methylprednisolon (Versie 1)

### Toepassingsgebied

Hoorn én Purmerend (voor thuiszorgmedewerkers in de regio)

### Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)

Het geneesmiddel is al voor toediening gereed gemaakt (VTGM) door de klinische farmacie van het Dijklander Ziekenhuis.

Gebruikte hulpmiddelen bij VTGM (t.b.v. declaraties openbare apotheek)

- Methylprednisolon infusiepoeder 1000mg (Solu-Medrol)
- Natriumchloride infvst 9 mg/ml (0,9%) zak 100 mL

### Generieke naam

Methylprednisolon (als natriumsuccinaat)

### Merknaam/synoniem

Solu-Medrol ®

### Afleveringsvorm

Methylprednisolon wordt als infuuszak geleverd voor intraveneuze infusie.

#### Methylprednisolon infuus

Dosering	Oplosmiddel	Volume
1000 mg	NaCl 0,9%	100 mL

Wordt geleverd met:

- Omniflush spuit 10ml NaCl 0,9% (om te flushen).
- Chloorhexidine 0,5% in ethanol 70% (om de huid te reinigen voor het aanprikken van het infuus).

### Toedienen

#### Methylprednisolon

Toedienroute	Toedientijd	Bijzonderheden
Intraveneus	30 minuten	-

#### Aandachtspunten

- Bij te snelle intraveneuze toediening (meer dan 500 mg in minder dan 10 minuten) zijn hartaritmieën, circulatoire collaps en hartstilstand gemeld.

### Houdbaarheid / bewaarcondities

Houdbaarheid	Bewaarcodities
7 dagen (datum op etiket)	In de koelkast (2-8 °C)

## Verenigbaar met

**In hetzelfde infuus:** clindamycine, dopamine, granisetron, heparine, metoclopramide, noradrenaline, ranitidine, theofylline, verapamil.

**Over dezelfde lijn:** aciclovir, alprostadil, amfotericine B, anidulafungine, bivalirudine, ceftazidim, linezolid, metronidazol, morfine, pethidine, piperacilline-tazobactam, remifentanil, tacrolimus  
+ alle stoffen genoemd bij "in hetzelfde infuus".

## Onverenigbaar met

Allopurinol, benzylpenicilline-natrium, calciumgluconaat, caspofungine, ciprofloxacin, cisatracurium, diltiazem, doxapram, filgrastim, kaliumchloride, ondansetron, pantoprazol, propofol.

Voor alle overige geneesmiddelen die hier niet zijn genoemd, geldt in principe dat deze onverenigbaar zijn met methylprednisolon.

## Bijzonderheden

- Bij verdunnen in infuusvloeistof is het mogelijk dat na enige uren troebeling of neerslagvorming optreedt. Stop dan de toediening en overleg met een arts. De troebeling ontstaat door het vrijkomen van vrij (onoplosbaar) methylprednisolon uit methylprednisolonnatriumsuccinaat.
- Acute reacties: allergische reacties en anafylactische reacties zijn waargenomen.
- Voor toediening van methylprednisolon bij een meerdaagse kuur bij multiple sclerose wordt 1000 mg methylprednisolon toegevoegd aan 100 ml NaCl 0,9% met een inlooptijd van 60 min.