

Toedieninformatie thuiszorg:Piperacilline/Tazobactam gebufferd (Versie 2)

Toepassingsgebied

Hoorn én Purmerend (voor thuiszorgmedewerkers in de regio)

Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)

Het geneesmiddel is al voor toediening gereed gemaakt (VTGM) door de klinische farmacie van het Dijklander Ziekenhuis.

Gebruikte hulpmiddelen bij VTGM (t.b.v. declaraties openbare apotheek)

- Piperacilline/Tazobactam Fresenius KABI Nederland BV 4000/500mg flacon, ZI: 15554090
- NaCl 0,9% 100ml infuuszak (qs) en NaCl 0,9% 250ml infuuszak (qs)
- Natriumcitraat 2000mg/50ml (qs) ZI: 16906950

Generieke naam

Piperacilline-tazobactam

Merknaam/synoniem

Tazocin

Afleveringsvorm

Piperacilline-tazobactam wordt als infuuszak geleverd voor intraveneuze infusie.

Piperacilline-tazobactam infuuszak

Dosering	Oplosmiddel	Volume
4000/500mg 8000/1000mg	NaCl 0,9%	Toegevoegd aan 100ml
12000/1500mg 16000/2000mg	NaCl 0,9%	Toegevoegd aan 250ml

Wordt geleverd met:

- Omniflush spuit 10ml NaCl 0,9% (om te flushen).
- Chloorhexidine 0,5% in ethanol 70% (om de huid te desinfecteren voor het aanprikken van het infuus).

Toedienen

Toedienroute	Toedientijd	Bijzonderheden
Intraveneus als infuus	Toedienen in 30 minuten of 24 uur (als continu infuus)	

Aandachtspunten

- Acute reacties: overgevoelighedsreacties en anafylactische reacties zijn waargenomen.

Houdbaarheid / bewaarcondities

Houdbaarheid	Bewaarcodities
--------------	----------------

13 dagen* (datum op etiket)	Gekoeld + donker bewaren
-----------------------------	--------------------------

* Houdbaarheid is inclusief 48 uur bij kamertemperatuur (voor het aanhangen).

Verenigbaar met

Over dezelfde lijn: anidulafungine, bivalirudine, bumetanide, buprenorfine, calciumgluconaat, clindamycine, cotrimoxazol, dexamethason, dopamine, fluconazol, folinezuur, furosemide, granisetron, heparine, hydrocortison, kaliumchloride, linezolid, lorazepam, magnesiumsulfaat, mannitol, mesna, methylprednisolon, metoclopramide, metronidazol, morfine, ondansetron, pethidine, ranitidine, remifentanil, theofylline, tigecycline, zidovudine.

Onverenigbaar met

Aciclovir, amikacine, amiodaron, amfotericine B, caspofungine, dobutamine, doxycycline, droperidol, ganciclovir, gentamicine, haloperidol, nalbufine, natriumbicarbonaat, pantoprazol, promethazine, Ringerlactaat, tobramycine.

Bijzonderheden

- Kruisovergevoeligheid en -resistentie met penicillines, cefalosporines en andere -lactam antibiotica is gemeld