



Hamile  
kalmaya  
yardımcı  
ürün

# Decapeptyl®'in kullanımı

Açıklamalar ve pratik bilgiler

**FERRING**

PHARMACEUTICALS

# Kolofon

**Ferring B.V.**

Polarisavenue 130  
2132 JX Hoofddorp

Postbus 184  
2130 AD Hoofddorp

E-posta: [infoNL@ferring.com](mailto:infoNL@ferring.com)  
İnternet sitesi: [www.ferring.nl](http://www.ferring.nl), [www.decapeptyl.nl](http://www.decapeptyl.nl)

© 2020, Ferring B.V. Hoofddorp, Hollanda. NL-DECSC-2000014

Tüm hakları saklıdır. Bu yayının parçaları Ferring şirketinin yazılı izni olmadıkça üçüncü şahısların kullanımı için veya ticari amaçlı olarak kullanılamaz veya çoğaltılamaz.

Yayınevi ve yazar, bu baskının derlenmesi sırasında gereken tüm tedbirleri almıştır. Buna rağmen, metin hatalardan tamamiyle arındırılmamış olabilir. Yayınevi ve yazar, metinde bulunan olası yazım ve içerik hatalarından veya bu hatalar yüzünden yahut bu yayının kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek yan etkilerden veya hak taleplerinden sorumlu değildir.

**Bu yayın aşağıdaki kurum tarafından yayınlanmıştır:****Ariez B.V.**

Westzijde 22  
1506 EE Zaandam

Telefon: 075 - 6429 420  
İnternet sitesi: [www.ariez.nl](http://www.ariez.nl)

# İçindekiler

	Giriş	04
<b>1</b>	Decapeptyl®'i tercih etme	05
1.1	Decapeptyl®'in etkileri	05
1.2	Decapeptyl®'in uygulanması subkütan	07
<b>2</b>	Decapeptyl®'in Kullanımı	08
2.1	Decapeptyl® uygulanması subkütan	08
2.2	Decapeptyl®'in yan etkileri	09
<b>3</b>	Sıkça sorulan soruların cevapları	10
<b>4</b>	Yararlı internet siteleri	11

# Giriş

Hormonlar, vücudumuzdaki sinyalleri vücudun bir yerinden başka bir yerine taşıyan maddelerdir. Hormonlar bu yöntemle vücudumuzda birçok önemli işlemi düzenler. Mesela tiroit bezinin düzenli çalışmasını sağlayan hormonlar vardır. Vücudumuzun sıvı dengesini düzenleyen hormonlar ve yine üremede görevli olan diğer hormonlar bulunmaktadır.

Farklı hormonların çalışma şekilleri hakkındaki bilginin artması sayesinde bu maddelerin suni yapımı ve belli hastalıkların tedavisinde ilaç olarak kullanılması mümkün olmuştur.

Decapeptyl® vücut hormonlarının üretilmesine etki eden bir maddedir. Bu broşür, bu ilacın sizin durumunuzda ne işe yaradığını ve doktorların bu ilacı hangi hastalıklar için yazabileceğini açıklamaktadır.



# 1 Decapeptyl®'i tercih etme

Decapeptyl® deri altına subkütan uygulanacak günlük enjeksiyonlar için çözelti olarak kullanılır.


1.1

## Decapeptyl®'in etkileri

Decapeptyl® ilacındaki etken maddeye triptorelin denir. Bu maddenin etkisi, vücut hormonlarından GnRH (veya gonadorelin) hormonuyla neredeyse aynı etkiye sahiptir: bu hormon, luteinize edici hormonları (LH) ve folikül uyarıcı hormonları (FSH) üretmesi için hipofiz bezini (beynin alt kısmında bir bez) uyarır.

LH ve FSH, östrojen ve progesteron hormonlarının üretilmesinden sorumludur. Östrojen, kadınsal cinsiyet özelliklerinin gelişiminde, adet dönüsünün düzenlenmesinde ve gebelik sırasında önemli rol oynamaktadır.





Hipotalamustan (yine beyinde bir salgı bezi) pulsalar şeklinde serbest kalan doğal GnRH'nin aksine Decapeptyl® hipofizin sürekli uyarılmasını sağlar. Bu sayede hipofiz 'yorgun düşer': LH ve FSH konsantrasyonları başlangıçta arttıktan sonra, sonunda kanda tam tersine azalır. Böylece daha az östrojen açığa çıkar.

Yani, Decapeptyl®'in kullanımı LH ve FSH hormonlarının üretimini azalmasını sağlar ve bunun sonucunda daha az östrojen salgılanır.

## 1.2

### Decapeptyl®'in uygulanması subkütan (deri altı)

#### **Yardımla üreme tedavisinde yumurtlamanın engellenmesi**

Deri altına günlük enjeksiyonlar şeklinde uygulanan Decapeptyl® yumurtalıkların hormonlar tarafından uyarılması amacıyla uygulanan yardımla üreme tekniklerinin bir parçasıdır. 4.Birden fazla olgun yumurtanın yumurtalıktan toplandıktan sonra döllenmenin vücut dışında gerçekleştirildiği Tüp Bebek Uygulaması (IVF) ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) buna örnek gösterilebilir.

Normal bir adet döngüsünde genellikle bir defada yalnızca bir yumurta olgunlaşır. Gerek IVF gerekse ICSI uygulamalarında yumurtalıklar, birden fazla embriyo elde edebilmek amacıyla aynı anda birden fazla yumurtanın olgunlaşması için hormonlarla uyarılır. Yumurtalıkların uyarılmasındaki en önemli hormon FSH'dir.

Normalde adet döngüsünün başlangıcından bir hafta sonra, yüksek miktarda LH oluşturulması için yumurtalıklardan beyine bir sinyal gönderilir. Bu LH artışı bir yumurtanın serbest kalmasını sağlar. İşte o an, yumurtlama (ovülasyon) anıdır. Ancak IVF veya ICSI tedavisinde birden fazla olgun yumurta 'elde edebilmek' için doğal ovülasyona izin verilmez. Decapeptyl® bu süreçte kadın vücudundaki LH-üretimini bastırılması ve böylece doğal ovülasyonun önlenmesi amacıyla uygulanır.

Foliküllerde bulunan yumurta yeterince olgunlaşmışsa, yumurtlama hareketi (hCG-uzun süre etkili LH hormonunun enjeksiyonu ile) yine yapay olarak gerçekleştirilebilir. Ancak daha sonra, ovülasyon gerçekten oluşmadan önce, olgunlaşmış yumurtalar yumurtalıktan iğne ile "toplanırlar" yumurtalıklardan alınır. Yumurtalar vücut dışında döllendikten sonra en iyi embriyolar seçilir ve içlerinden bir veya en fazla iki embriyo rahim içine geri yerleştirilir.

## 2 Decapeptyl®'in kullanımı

Decapeptyl®'in etken maddesi olan triptorelin, bir proteindir. Proteinler bağırsaklarda parçalanırlar. Dolayısıyla Decapeptyl® 1. tablet şeklinde oral yolla alınamaz; deri altına enjekte edilmelidir. Decapeptyl®, enjekte edildikten sonra bağırsaklarda parçalanmaksızın işlevini gerçekleştireceği organa doğrudan ulaşacak şekilde kan içine emilir.

Enjeksiyon sayısını tedaviyi yürüten doktorunuz belirler. Günlük olarak deri altına (subkütan) enjekte edilen Decapeptyl® kullanıcı tarafından uygulanabilir. Bu broşürde deri altı enjeksiyonunun mümkün olduğunca sorunsuz devam etmesi için tavsiyeler verilmiştir.

### 2.1

#### Decapeptyl® uygulanması subkütan

##### Genel Bilgiler

Koruyucu folyoyu çıkartın ve blister ambalajından enjeksiyon şiringasını alın. Şiringayı, gri koruyucu kapağı yukarıya gelecek şekilde dik tutun. Gri koruma kapağını çıkarın. Emiciyi, en büyük hava kabarcığı çıkana kadar dikkatli bir şekilde biraz itin.







Decapeptyl® alt karnın (batının) deri altına günde bir defa enjekte edilerek uygulanmalıdır. Uygun bir deri katmanını başparmağınız ve işaret parmağınızla yukarı çekin. İğnenin tamamını cilt katmanının içine doğru itin ve şırıngayı yavaşça içine boşaltın.

## 2.2

### Decapeptyl®'in yan etkileri

Decapeptyl®'in olası yan etkileri broşürde bildirilmiştir. Bu broşürü baştan sona okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu yan etkilerle ciddi bir şekilde karşılaşmanız halinde doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz. Eğer broşürde bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız bu durumu

hemen doktorunuza bildirin. Aşağıda broşürün özeti bulunmaktadır. Decapeptyl®'in uygulandığı yerde ağrı hissedebilirsiniz. Sıcak basması yaygındır. Decapeptyl®'in kullanımı depresyon ve sinirlilik, bulantı, kas veya eklem ağrısı, yorgunluk ve uyku bozuklukları ile ilişkili olabilir. Ayrıca enjeksiyonlar kaşıntı, döküntü ya da ateşe neden olabilir. Bu durum Decapeptyl®'e karşı gösterilen aşırı duyarlılıktan kaynaklanabilir.

Decapeptyl®'in en önemli veya en yaygın yan etkileri şunlardır:

- terleme,
- cinsel ilişki sırasında vajinada ağrı ve/veya kuruluk,
- ara kanamalar,
- cinsel hislerde azalma,
- duygudurum dalgalanmaları.

## 3 Sıkça sorulan soruların cevapları

### **Decapeptyl®'i ne kadar süre boyunca kullanabilirim?**

Decapeptyl® hormonların yapay hormon üreme teknikleriyle uyarılması sırasında veya öncesinde kullanıldığında, tedavi genelde yumurtalar yeterince büyüyene kadar ve hCG içeren maddenin enjeksiyonla oositi kesin olarak gerçekleştirilene kadar devam ettirilir. Anlaşılmayan konular için lütfen doktorunuza veya eczacınıza başvurun.

### **Decapeptyl® enjekte etmeyi unutursam Decapeptyl® ne yapmalıyım?**

Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayın. Decapeptyl® kullanmayı unutursanız doktorunuza veya eczacınıza başvurun.

### **Enjeksiyon yerinde oluşan ağrıyı önlemek için ne yapabilirim?**

Enjeksiyonu her seferinde başka bir yerden uygulayın. Enjeksiyonlar üst koldan, bacakların üst kısmından veya göbek etrafındaki deriden uygulanabilir.

### **Decapeptyl®'i nasıl saklamalıyım?**

Decapeptyl®'i (2- 8°C arasında) buzdolabında orijinal ambalajında saklayın. Decapeptyl® dondurulmamalıdır. Decapeptyl®'i de diğer ilaçlar gibi çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

*Daha fazla bilgi için Decapeptyl® de 'in prospektüsünü okuyabilir veya doktorunuza veya eczacınıza başvurabilirsiniz.*

## 4 Yararlı internet siteleri

### [www.decapeptyl.nl](http://www.decapeptyl.nl)

Bu adreste Decapeptyl®'in prospektüsünü ve bu broşürün pdf versiyonunu bulabilirsiniz. Ayrıca bu internet sitesinde Decapeptyl® çözeltisinin enjeksiyon videolarını da izleyebilirsiniz.

### [www.hulpbijzwangerworden.nl](http://www.hulpbijzwangerworden.nl)

Hamile kalma konusunda ayrıntılı bilgiler içeren bir internet sitesidir.

### [www.freya.nl](http://www.freya.nl)

Doğurganlık konusunda problem yaşayan insanlara yönelik bir "Hastalar Birliği" internet sitesidir.

### [www.nvog.nl](http://www.nvog.nl)

Hollanda Kadın Hastalıkları ve Doğum Derneği internet sitesidir.

### [www.vruchtbaarheid.startpagina.nl](http://www.vruchtbaarheid.startpagina.nl)

Doğurganlık hakkındaki bir başlangıç sayfasıdır.



**FERRING**  
PHARMACEUTICALS

