Toedieninformatie thuiszorg: furosemide (Versie 7)

Toepassingsgebied

Hoorn én Purmerend (voor thuiszorgmedewerkers in de regio)

Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)

Het geneesmiddel is al voor toediening gereed gemaakt (VTGM) door de klinische farmacie van het Dijklander Ziekenhuis.

Gebruikte hulpmiddelen bij VTGM (t.b.v. declaraties openbare apotheek)

- Furosemide Sandoz 10mg/ml ampul 25ml (qs)
- Kortlopend/langlopend infuus: NaCl 0,9% 50ml infuuszak (qs), ZI: 15111237
- (Tijdelijk) Furosemide 1000mg = 100ml CADD-Cassette, ZI: 16903641

Generieke naam

Furosemide 80 mg - 1000 mg

Merknaam/synoniem

Lasix®

Afleveringsvorm

Furosemide wordt als infuuszak of als CADD-Cassette (beide in UV werende omzak) geleverd voor intraveneuze infusie.

Furosemide infuuszak

Dosering	Oplosmiddel	Volume
80 mg - 1000 mg	NaCl 0,9%	Toegevoegd aan 50 ml

Let op bij hogere doseringen kan de totale volume van de infuuszak oplopen tot 148ml.

Furosemide Cassette

Dosering	Oplosmiddel	Volume
1000 mg	nvt	100 ml Cassette

Worden beide geleverd met:

- Omniflush spuiten 10ml NaCl 0,9% (om te flushen bij het verwisselen van de continue infuus).
- NaCl 0,9% 50ml infuuszak (om te spoelen na een kortlopend infuus)

Toedienen

Furosemide

Toedienroute	Toedientijd	Bijzonderheden
Intraveneus	Variabel. Langlopend met een infuuspomp of kortlopend als vrij lopend infuus. In beide gevallen maximaal 4 mg/min toedienen.	Maximale snelheid 4 mg/min

Aandachtspunten

- Acute reacties: overgevoeligheidsreacties zijn waargenomen.

Houdbaarheid / bewaarcondities

Furosemide infuuszak

Houdbaarheid	Bewaarcodities
30 dagen* (datum op etiket)	Gekoeld + donker bewaren

* Na aansluiten 7 dagen houdbaar bij 25°C.

Bij het bewaren van de infuuszak in de koelkast kan een neerslag ontstaan. Dit lost weer op bij kamertemperatuur, zonder dat de stabiliteit van furosemide wordt beïnvloed.

Furosemide Cassette

Houdbaarheid	Bewaarcodities
30 dagen* (datum op etiket)	Donker bewaren beneden de 25°C.

* Na aansluiten 7 dagen houdbaar bij 25°C.

Verenigbaar met

In hetzelfde infuus: adrenaline, atropine, calciumgluconaat, cefuroxim, dexamethason, digoxine, heparine, isosorbidedinitraat, lidocaïne, natriumbicarbonaat, ranitidine, butylscopolamine, theofylline.

Over dezelfde lijn: allopurinol, amfotericine B, anidulafungine, argatroban, bivalirudine, ceftazidim, foscarnet, granisetron, hydrocortison, kaliumchloride, micafungine
+ alle stoffen genoemd bij "in hetzelfde infuus".

Onverenigbaar met

Amiodaron, ascorbinezuur, buprenorfine, caspofungine, ciprofloxacine, coffeïne, diazepam, diltiazem, dobutamine, dopamine, doxapram, droperidol, erytromycine, esmolol, fenylefrine, filgrastim, fluconazol, gentamicine, isoprenaline, labetalol, levofloxacine, metoclopramide, midazolam, milrinon, nicardipine, ondansetron, pethidine, pantoprazol, promethazine, vecuronium.

Bijzonderheden

- Langdurige blootstelling aan licht kan verkleuring veroorzaken; geelgekleurde injectievloeistof niet gebruiken.
- De pH van furosemide injectievloeistof is 8,0-9,3.