Toedieninformatie thuiszorg: amoxicilline 12g (Versie 1)

Toepassingsgebied

Hoorn én Purmerend (voor thuiszorgmedewerkers in de regio)

Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)

Het geneesmiddel dient voor toediening gereed gemaakt (VTGM) te worden door verpleegkundigen van de Technische Thuiszorgteams van Evean, Omring en Zorgcirkel.

Gebruikte middelen bij VTGM (t.b.v. declaraties openbare apotheek)

- Amoxicilline Prolepha 2 g (qs), ZI: 17351103
- Water voor injecties ampul 20 ml (qs), ZI: 13880624
- NaCl 0,9% 500ml infuuszak met luerlock (qs), ZI: 15855813

Generieke naam

Amoxicilline (12000 mg)

Merknaam/synoniem

Clamoxyl

Afleveringsvorm

Amoxicilline wordt ivm beperkte houdbaarheid niet als kant en klare infuuszak geleverd maar dient direct voor intraveneuze toediening bereid te worden bij de patient thuis.

Amoxicilline infuuszak

Dosering	Oplosmiddel	Volume
6000mg	NaCl 0,9%	Toegevoegd aan 500 ml

Wordt geleverd met:

- Omniflush spuiten 10ml NaCl 0,9% (om te flushen).

F.T.G.

Dit hoofdstuk komt te vervallen

Voor toediening gereed maken

- leg 3 x 2000mg amoxicilline, 3 x 20ml water voor injecties en 1 x NaCL 0,9% 500ml infuuszak klaar
- desinfecteer de rubberstops van de Amoxicilline flacons met Alcohol 70%
- los 2000mg amoxicilline op in 20 ml Water voor injecties
- herhaal dit voor 2 andere 2000mg flacons
- trek de inhoud van de 3 flacons op in 2 BD- 50ml-luerlock spuiten (totaal ca 65 ml)
- spuit de inhoud van de spuit via het (lichtblauwe) luerlock bijspuitpunt in de NaCl 0,9% 500ml infuuszak

Toedienen

Amoxicilline

Toedienroute	Toedientijd	Bijzonderheden
Intraveneus	12 uur (als continu infuus)	-

Aandachtspunten

- Intraveneuze toediening geeft vaak aanleiding tot irritatie of flebitis. Toediening via een groot/centraal bloedvat verdient daarom de voorkeur.
- Acute reacties: anafylactische reacties zijn waargenomen.

Houdbaarheid / bewaarcondities

Amoxicilline

Houdbaarheid	Bewaarcondities
12 uur	nvt

Bijzonderheden

- (Kruis)allergie met andere penicillines en cefalosporines is gemeld maar zal zich thuis (bijna) nooit voordoen aangezien er in het ziekenhuis meestal al > 1 week behandeld is.