



Implantatie Insertable Loop Recorder (ILR)

Cardiologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Naam patiënt:

De implantatie van een REVEAL DX of XT wordt verricht op de afdeling hartkatheterisatie van het **Westfriesgasthuis**, Maelsonstraat 3, 1624 NP Hoorn.

U kunt zich melden opdag om uur bij de informatiebalie in de centrale hal van het Westfriesgasthuis.

Voor deze ingreep moet u **nuchter** zijn; u mag dus niets eten of drinken vanaf 10.00 uur 's morgens.

Waarom wordt een ILR geïmplanteed?

Met een ILR kan de oorzaak van bepaalde klachten die u heeft, gevonden worden. De klachten kunnen zijn: flauwvallen, licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, hartkloppingen.

Een van de oorzaken kan een hartritmestoornis zijn. Met een ILR kan worden vastgesteld of een hartritmestoornis de oorzaak is van uw klachten.

Ook kan met een ILR worden bekeken of bepaalde medicijnen die u heeft gekregen helpen om uw klachten te verhelpen of te verminderen.

Hoe werkt de ILR?

De ILR registreert uw hartactiviteit (hartritme). Wanneer u klachten heeft, kan aan de ILR de opdracht worden gegeven een beeld van het hartritme vast te leggen. Dit beeld (het ECG) wordt bekeken door de cardioloog. De cardioloog kan aan het ECG zien of uw hart te langzaam, te snel, onregelmatig of normaal klopt. Vervolgens kan de cardioloog beslissen wat de meest effectieve behandeling is voor u. Dat opnemen of vastleggen van het hartritme bij klachten gebeurt met een los apparaatje, de Activator, die u meekrijgt.

De implantatie

De implantatie van de ILR wordt uitgevoerd door één van de cardiologen samen met een arts-assistent en medewerkers van de katheterisatiekamer. De ingreep is een eenvoudige ingreep en duurt ongeveer één uur.

De ILR is een klein apparaatje (kleiner dan een pakje kauwgom). Het apparaat wordt boven of onder in de borst onder de huid geplaatst. De plaats op de borst waar het apparaatje wordt ingebracht wordt verdoofd (vergelijkbaar met een verdoving bij de tandarts). Vervolgens wordt een klein sneetje in de huid gemaakt en het apparaatje wordt hier ingeschoven. De huid wordt vervolgens gehecht. Als u terug bent op de verpleegafdeling moet u één uur bedrust houden, daarna mag u uit bed en ongeveer twee uur na de ingreep mag u naar huis.

De Activator

Het gebruik van de Activator wordt u uitgelegd door de pacemakertechnicus.

De Activator is een apparaatje dat u meekrijgt. Hiermee activeert u de ILR om het hartritme op te slaan wanneer u klachten heeft. De Activator is gemakkelijk te bedienen met een knop op het apparaat. Wanneer u het hartritme vastlegt tijdens of vlak na de klachten blijft de registratie van het hartritme bewaard zodat de cardioloog precies kan zien wat er gebeurd is voor, tijdens en na uw klachten. Het is dus belangrijk om de Activator altijd bij u te dragen.

Nadat u de Activator gebruikt hebt

Nadat u de Activator gebruikt hebt of nadat u bent flauwgevallen moet u contact opnemen met de pacemakertechnicus.

Dit kan tijdens kantooruren via telefoonnummer: 0229 257 257.

De pacemakertechnicus zal een afspraak met u maken om de opgeslagen gegevens van het hartritme, uit te lezen en op te slaan in uw medisch dossier. De opgeslagen gegevens worden vervolgens gewist uit het geheugen van de ILR.

Het is **belangrijk** dat u een afspraak maakt met de pacemakertechnicus om de gegevens die u heeft opgeslagen van het hartritme uit te lezen en om vervolgens het geheugen van de ILR weer leeg te maken, omdat het geheugen van de ILR beperkt is. Als u hiervoor geen afspraak maakt kan het zijn dat het geheugen vol raakt en u geen opnamen meer kunt maken wanneer u weer last krijgt.

Gebruikt u: bloedverdunners, laxeermiddelen, plaspillen, insuline of andere medicijnen? Dan moet u de volgende 6 punten lezen:

1. Gebruikt u Sintrommitis (**Acenocoumarol**) of **Marcoumar**? Drie dagen (bij sintrommitis) of vijf dagen (bij marcoumar) voor de ingreep moet u met deze medicatie stoppen, tenzij de cardioloog dit anders met u heeft afgesproken.
2. Heeft u een klepprotese? Dan mag u hiermee **niet stoppen** en krijgt u eventueel antibiotica. De dag van de opname zal nog bloed worden afgenomen voor de stolling.
3. Op de dag van de implantatie mag u geen **laxeermiddel** gebruiken.
4. Gebruikt u **plaspillen** (diuretica)? U kunt 's morgen wel u plaspil innemen.
5. Gebruikt u **andere medicijnen** dan hierboven beschreven? Deze kunt u gewoon innemen.
6. Gebruikt u **insuline**? U kunt uw insuline in de ochtend spuiten en gewoon ontbijten. Na 10.00 uur neemt u een halve dosering (indien van toepassing) met een beschuit of één snee brood en een kopje thee.

Voor iedere patiënt:

Voor deze ingreep moet u **nuchter** zijn; u mag dus niets eten of drinken vanaf 10.00 uur 's morgens (tenzij u insuline gebruikt; zie hierboven bij punt 6).

Het is verstandig om een familielid of iemand anders mee te nemen tijdens deze dag.

Denkt u er aan om al uw medicijnen die u gebruikt mee te nemen?

Mocht u nog vragen hebben of bent u verhinderd?

U kunt ons tijdens kantooruren bereiken via: 0229 257219.

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0299 457 001

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00215-NL 08-01-2019