



Abatacept

Orencia®

Reumatologie

Inhoudsopgave

Pagina

Hoe werkt abatacept?.....	3
Voor welke aandoeningen gebruik je abatacept?	3
Hoe moet ik het gebruiken?.....	3
Hoe bewaar ik abatacept?	4
Welke bijwerkingen kan ik krijgen?	4
Zijn er controles nodig als ik abatacept gebruik?	5
Kan ik abatacept gebruiken met andere medicijnen?.....	5
Wat moet ik nog meer weten?	6
Meer informatie of vragen?.....	8

Hoe werkt abatacept?

Als je een vorm van ontstekingsreuma hebt, is er een fout in je afweersysteem (immuunsysteem) ontstaan. Je afweersysteem is ontregeld en slaat als het ware 'op hol'. Je lichaam denkt dat goede (lichaamseigen) cellen kwade indringers zijn en je afweersysteem wil die indringers verdrijven. Hierdoor komen bepaalde stoffen vrij waardoor ontstekingen ontstaan in gewrichten, pezen, spieren of organen. Dit kan in verschillende plaatsen van het lichaam gebeuren. Bij reumatische aandoeningen zijn dit vaak de gewrichten.

Abatacept is een medicijn dat deze afweerreactie onderdrukt. Dit medicijn remt bepaalde overactieve witte bloedcellen waardoor ontstekingen worden geremd. Hierdoor vermindert de pijn, zwelling en stijfheid van je gewrichten waardoor er op langere termijn minder kans op gewrichtsschade is. De werking van abatacept treedt op na 6 tot 12 weken.

Soms duurt het langer en bij sommige mensen werkt het medicijn helaas niet of onvoldoende.

Voor welke aandoeningen gebruik je abatacept?

Je arts schrijft je abatacept voor als je een autoimmuunziekte hebt zoals reumatoïde artritis, artritis psoriatica of juveniele idiopathische artritis (JIA, jeugdreuma).

Hoe moet ik het gebruiken?

Abatacept krijg je via een infuus (intraveneus) of via een onderhuidse injectie (subcutaan).

Infuus

De infusen krijg je toegediend op de dagbehandeling van het ziekenhuis. De eerste drie infusen ontvang je om de twee weken. Daarna krijg je het infuus eenmaal per 4 weken toegediend. De duur van het infuus is twee uur waarna nog een naspoeling met een zoutoplossing volgt. De gebruikelijke dosering van het infuus is 500 mg, 750 mg of 1000 mg, afhankelijk van je gewicht.

Onderhuidse injectie

Je kunt bij jezelf de onderhuidse injecties abatacept zetten. De reumaverpleegkundige legt je uit hoe je dit het beste kan doen. Als je het vervelend vindt om jezelf een injectie te geven vraag dan een familielid of andere bekende dit bij je te doen. Hij of zij krijgt dan ook instructie. De gebruikelijke dosering van abatacept via een onderhuidse injectie is 1 maal per week 125 mg op een vaste dag. Als je aandoening rustig is, zal je arts samen met je bespreken om de dosering te verlagen en als het kan de abatacept zelfs te stoppen.

Hoe bewaar ik abatacept?

Abatacept bewaar je in de koelkast bij een temperatuur tussen de 2°C en 8°C. Haal de injectiespuit 30 minuten voor toediening uit de koelkast om op kamertemperatuur te laten komen.

Welke bijwerkingen kan ik krijgen?

De apotheker geeft je altijd een bijsluiter mee. Lees deze bijsluiter goed. Je leest in de bijsluiter een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen, van zeer vaak tot zeer zelden. Het is mogelijk dat je een bijwerking krijgt, maar dat hoeft niet.

Hieronder lees je welke belangrijke bijwerkingen kunnen voorkomen bij abatacept gebruikers:

- Bovenste luchtweginfecties zoals neusverkoudheid komen regelmatig voor
- Maag- en darm klachten (zoals misselijkheid, overgeven en buikpijn)
- Hoofdpijn
- Klachten van de huid op de plaats waar de injectie of het infuus wordt toegediend. Denk aan roodheid, zwelling, jeuk, blauwe plekken of pijn. Dit is vrijwel altijd mild en vermindert meestal in de loop van de behandeling.

- Infecties: je kunt makkelijker een infectie krijgen en soms verlopen infecties ook heftiger. Dit komt doordat abatacept de werking van specifieke cellen of eiwitten in je afweersysteem remt. Hierdoor wordt ook jouw afweer tegen infecties geremd. Als je een gewone verkoudheid hebt zonder koorts, dan kun je abatacept gewoon door blijven gebruiken. Als je een infectie met koorts hebt, of je ziek voelt mag je meestal (tijdelijk) geen abatacept gebruiken. Koorts is vaak een teken van een infectie of ontsteking in je lichaam. Neem dan altijd contact op met je reumatoloog, reumaverpleegkundige of huisarts.
- Allergische reacties: wanneer je overgevoelig bent voor abatacept kun je een allergische reactie krijgen. Denk aan huidafwijkingen, koorts of benauwdheid. Neem dan zo snel mogelijk contact op met je huisarts, reumaverpleegkundige en/of behandelaar.
- Overgevoelighedsreacties: tijdens het infuus is het mogelijk dat er een overgevoelighedsreactie optreedt. Als het nodig is, wordt de toediening van het abatacept vertraagd of gestopt of krijg je een medicijn om deze reactie tegen te gaan.

Zijn er controles nodig als ik abatacept gebruik?

Voordat je begint met abatacept wordt er eerst gekeken of je geen (sluimerende) infectie onder de leden hebt. Denk aan tuberculose (TBC) of een leverontsteking (hepatitis). Om tuberculose uit te sluiten krijg je eventueel een Mantoux-test en/of een bloedonderzoek en een röntgenfoto van de longen. Soms is een bepaalde inenting (vaccinatie) voor het starten met abatacept nodig. Je arts bespreekt dit met je.

Kan ik abatacept gebruiken met andere medicijnen?

Abatacept gebruik je onder andere bij reumatoïde artritis en bij voorkeur in combinatie met methotrexaat of een ander reuma remmend medicijn. Deze combinatie is meestal effectiever. Abatacept kan je – voor zover bekend – veilig gebruiken naast andere geneesmiddelen. Het is verstandig altijd aan je arts en je apotheker te vertellen welke medicijnen je gebruikt of als er iets aan je medicijngebruik verandert.

Wat moet ik nog meer weten?

Alcohol

Er is geen bezwaar als je (matig) alcohol gebruikt tijdens behandeling met abatacept.

Autorijden

Abatacept zelf veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. Er is geen bezwaar tegen autorijden, fietsen, rijden met een scootmobiel of het besturen van een andere machine tijdens gebruik van abatacept. Behalve als je allergisch reageert op het infuus met abatacept en daar medicijnen voor krijgt. Deze medicijnen kunnen je rijvaardigheid wel beïnvloeden. Overleg dan met je behandelaar of je veilig kan rijden, fietsen of andere machines kunt besturen.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Ga je naar de tandarts voor een ingreep of word je geopereerd? Geef dan aan dat je abatacept gebruikt omdat er misschien een verhoogd risico op infecties is na een operatie. Overleg met je behandelaar of het nodig is abatacept tijdelijk te onderbreken. Wij adviseren om je (tand)arts op de hoogte te brengen dat je abatacept gebruikt zodat deze zo nodig maatregelen kan nemen.

Reizen

Onderhuidse injecties: als je op reis gaat, neem dan abatacept gekoeld in een koeltasje mee in je handbagage. Bewaar de abatacept op je verblijfadres zoals thuis, dus in de koelkast bij een temperatuur van 2-8°C.

Bij reizen naar het buitenland is het raadzaam een actueel overzicht van je medicijnen mee te nemen, het medicijnpaspoort. Daarin staat dat je abatacept met bijbehorende injectiespuiten vanwege medische noodzaak gebruikt. Dit paspoort kun je krijgen bij je apotheek of eventueel bij je behandelaar.

Vaccinaties

Als je begint met abatacept zal je behandelend arts je waarschijnlijk aanraden om een jaarlijkse griepvaccinatie te nemen omdat je door abatacept kwetsbaarder bent voor infecties zoals de griep.

Heb je een andere vaccinatie dan de griep nodig? Overleg dan altijd van tevoren met je specialist, apotheker of huisarts.

Heb je plannen om in de (nabije) toekomst een verre reis te maken? Als je op reis gaat heb je soms een inenting nodig. Gebruik je abatacept dan is een inenting met een levend vaccin af te raden. Denk aan het bof-mazelen-rode hond- (BMR), gele koorts- of poliovaccin. Overleg met je arts wanneer voor jou het beste moment is om je te laten vaccineren/inenten. Eventueel moet je dan (tijdelijk) stoppen met je medicatie. Het is verstandig dit ruim van te voren te regelen.

Bespreek ook het risico op tbc-besmetting met je reumatoloog of de GGD-arts van het reizigersspreekuur voordat je naar verre landen reist.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Heb je een kinderwens of ben je (onverwacht) zwanger, vertel dit dan aan je arts. Je arts zal dan samen met jou beslissen wat je het beste aan je medicijngebruik kan veranderen als dat nodig is. Overleg ook met je arts of je tijdens het gebruik van abatacept veilig borstvoeding kunt geven.

Van abatacept is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt.

Zonlicht

Bescherm je goed tegen blootstelling aan zonlicht en UV -straling tijdens het gebruik van abatacept. Je huid is gevoeliger voor de zon. Draag beschermende, liefst katoenen, kleding en gebruik bij blootstelling van de huid aan de zon een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 30 of hoger).

Maak liever geen gebruik van de zonnebank.

Meer informatie of vragen?

Als je nog vragen hebt, stel ze dan gerust aan je reumatoloog, reumaverpleegkundige of apotheker.

Colofon

De teksten in deze medicatiefolder zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), reumatologie netwerk Zuid-Oost Nederland en ReumaNederland.

ReumaNederland

Postbus 59091
1040 KB Amsterdam

t 020 589 64 64

info@reumanederland.nl
www.reumanederland.nl
[Facebook.com/reumanederland](https://www.facebook.com/reumanederland)

november 2020

Copyright

Informatie uit deze folder hergebruiken/delen is toegestaan mits de bron (ReumaNederland) wordt genoemd.

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-01753-NL 28-01-2021