



Baricitinib

Olumiant®

Reumatologie

Inhoudsopgave

Pagina

Hoe werkt baricitinib?.....	4
Voor welke aandoeningen gebruik je baricitinib?	4
Hoe moet ik het gebruiken?	4
Hoe bewaar ik baricitinib?	5
Welke bijwerkingen kan ik krijgen?	5
Zijn er controles nodig als ik baricitinib gebruik?	6
Kan ik baricitinib gebruiken met andere medicijnen?.....	6
Wat moet ik nogmeer weten?	6
Meer informatie of vragen?.....	8

Hoe werkt baricitinib?

Als je een vorm van ontstekingsreuma hebt, is er een fout in je afweersysteem (immuunsysteem) ontstaan. Je afweersysteem is ontregeld en slaat als het ware 'op hol'. Je lichaam denkt dat goede (lichaamseigen) cellen kwade indringers zijn en je afweersysteem wil die indringers verdrijven. Hierdoor komen bepaalde stoffen vrij waardoor ontstekingen ontstaan in gewrichten, pezen, spieren of organen. Dit kan op verschillende plaatsen in je lichaam gebeuren. Bij reumatische aandoeningen zijn dit vaak de gewrichten.

Baricitinib is een medicijn dat deze afweerreactie onderdrukt en behoort tot de zogenaamde JAK (Janus-kinase) remmers. Baricitinib remt specifieke signalen in de cel waardoor de productie van ontstekingsfactoren afneemt. Hierdoor vermindert de pijn, zwelling en stijfheid van je gewrichten waardoor er op langere termijn minder kans op gewrichtsschade is. De werking van baricitinib treedt op na 8 tot 12 weken. Soms duurt het echter langer en bij sommige mensen werkt het medicijn helaas niet of onvoldoende.

Voor welke aandoeningen gebruik je baricitinib?

Je arts schrijft je baricitinib voor als je reumatoïde artritis hebt. Je krijgt dit middel alleen als andere reumamedicijnen niet goed bij je werken of als je teveel bijwerkingen daarvan hebt.

Hoe moet ik het gebruiken?

Baricitinib is verkrijgbaar in tabletten van 2 mg en 4 mg. Je arts spreekt met je af welke dosering je gaat gebruiken. De gebruikelijke dosering is 1 maal daags 4 mg. Je kunt de tabletten het beste tijdens de maaltijd met een glas water innemen. Slik elke tablet in zijn geheel door.

Als je aandoening rustig is, zal je arts samen met je bespreken om de dosering te verlagen en als het kan de baricitinib zelfs te stoppen.

Hoe bewaar ik baricitinib?

Baricitinib tabletten bewaar je in de originele verpakking bij een temperatuur lager dan 30°C.

Welke bijwerkingen kan ik krijgen?

De apotheker geeft je altijd een bijsluiter mee. Lees deze bijsluiter goed. Je leest in de bijsluiter een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen, van zeer vaak tot zeer zelden. Het is mogelijk dat je een bijwerking krijgt, maar dat hoeft niet.

Hieronder lees je welke belangrijke bijwerkingen kunnen voorkomen bij baricitinib gebruikers:

- Infecties zoals neusverkoudheid, gordelroos of blaasontsteking komen regelmatig voor. Als je deze klachten hebt, neem dan contact op met je (huis) arts
- Maag- en darmklachten (zoals misselijkheid en/of diarree)
- Verhoogd cholesterol gehalte •
- Bijwerkingen van organen: bijwerkingen die je zelf niet merkt maar je arts via bloedonderzoek wel in de gaten houdt. Het gaat om leverfunctietests, nierfunctietests en afwijkingen in het bloedbeeld.
- Infecties: baricitinib remt je afweersysteem. Hierdoor wordt ook jouw afweer tegen infecties geremd. Je kunt dus makkelijker een infectie krijgen en soms verlopen infecties ook heftiger. Als je een gewone verkoudheid hebt zonder koorts, dan kun je baricitinib gewoon door blijven gebruiken. Als je een infectie met koorts hebt of je ziek voelt, mag je meestal (tijdelijk) geen baricitinib gebruiken. Koorts is vaak een teken van een infectie of ontsteking in je lichaam. Neem dan altijd contact op met je reumatoloog, reumaverpleegkundige of huisarts.

Zijn er controles nodig als ik baricitinib gebruik?

Voordat je begint met baricitinib wordt er eerst gekeken of je geen (sluimerende) infectie onder de leden hebt. Denk aan tuberculose (TBC) of een leverontsteking (hepatitis). Om tuberculose uit te sluiten krijg je eventueel een Mantoux-test en/of een bloedonderzoek en een röntgenfoto van de longen.

Als je start met baricitinib laat je arts je bloed (in het begin) regelmatig controleren via het bloedprikken. Zo kan je arts goed in de gaten houden hoe je lichaam reageert op baricitinib. Ook bij verandering van dosering zal er extra bloedonderzoek plaatsvinden.

Kan ik baricitinib gebruiken met andere medicijnen?

Baricitinib gebruik je bij reumatoïde artritis, soms gecombineerd met methotrexaat maar dit is niet noodzakelijk. Je kunt baricitinib echter niet met alle reuma remmende medicijnen combineren. Je reumatoloog beoordeelt welke reumamedicijnen je kunt blijven gebruiken. Het is verstandig altijd aan je arts en je apotheker te vertellen welke medicijnen je gebruikt of als er iets aan je medicijngebruik verandert.

Wat moet ik nogmeer weten?

Alcohol

Er is geen bezwaar als je (matig) alcohol gebruikt tijdens behandeling met baricitinib.

Autorijden

Baricitinib veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. Er is geen bezwaar tegen autorijden, fietsen, besturen van een scootmobiel of machine tijdens gebruik van baricitinib.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Ga je naar de tandarts voor een ingreep of word je geopereerd? Geef dan aan dat je baricitinib gebruikt omdat er misschien een verhoogd risico op infecties is na een operatie, hoewel hier vooralsnog geen aanwijzingen voor zijn. Overleg met je behandelaar of het nodig is baricitinib tijdelijk te stoppen. Wij adviseren om je (tand) arts op de hoogte te brengen dat je baricitinib gebruikt zodat deze zo nodig maatregelen kan nemen.

Reizen

Bij reizen naar het buitenland is het raadzaam een actueel overzicht van je medicijnen mee te nemen, het medicijnpaspoort. Daarin staat dat je baricitinib vanwege medische noodzaak gebruikt. Dit paspoort kun je krijgen bij je apotheek of eventueel bij je behandelaar.

Vaccinaties

Als je begint met baricitinib zal je behandelend arts je waarschijnlijk aanraden om een jaarlijkse griep prik te nemen omdat je door baricitinib kwetsbaarder bent voor infecties zoals de griep.

Heb je een andere vaccinatie dan de griep nodig?

Overleg dan altijd van tevoren met je specialist, apotheker of huisarts.

Heb je plannen om in de (nabije) toekomst een verre reis te maken? Als je op reis gaat heb je soms een inenting nodig. Gebruik je baricitinib dan is een inenting met een levend vaccin af te raden. Denk aan het bof-mazelen-rode hond- (BMR), gele koorts- of poliovaccin. Overleg met je arts wanneer voor jou het beste moment is om je te laten vaccineren/inenten. Eventueel moet je dan (tijdelijk) stoppen met je medicatie. Het is verstandig dit ruim van te voren te regelen.

Bespreek ook het risico op tbc-besmetting met je reumatoloog of de GGD-arts van het reizigers-spreekuur voordat je naar verre landen reist.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Heb je een kinderwens of ben je (onverwacht) zwanger, vertel dit dan aan je arts. Je arts zal dan samen met jou beslissen wat je het beste aan je medicijngebruik kan veranderen als dat nodig is.

Van baricitinib is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt. Er is weinig informatie over de effecten van baricitinib tijdens zwangerschap. Baricitinib mag je daarom niet tijdens de zwangerschap gebruiken. Het is niet bekend of dit geneesmiddel in de moedermelk overgaat daarom mag je geen borstvoeding geven als je baricitinib slikt.

Meer informatie of vragen?

Als je nog vragen hebt, stel ze dan gerust aan je reumatoloog, reumaverpleegkundige of apotheker.

Colofon

De teksten in deze medicatiefolder zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), reumatologie netwerk Zuid-Oost Nederland en ReumaNederland.

ReumaNederland

Postbus 59091
1040 KB Amsterdam

t 020 589 64 64

info@reumanederland.nl
www.reumanederland.nl
[Facebook.com/reumanederland](https://www.facebook.com/reumanederland)

november 2020

Copyright

Informatie uit deze folder hergebruiken/delen is toegestaan mits de bron (ReumaNederland) wordt genoemd.

Disclaimer

Aan deze folder kun je geen rechten ontlenen.
Controleer het altijd met de tekst in de bijsluiters die je bij je medicijn hebt gekregen. Neem bij vragen of onduidelijkheden over het medicijn contact op met je behandelend arts.

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-01756-NL 28-01-2021