



Besnijdenis (circumcisie) bij kinderen

Urologie

Inleiding

In overleg met uw behandelend uroloog zal er bij u of uw zoon(tje) een circumcisie worden verricht. Bij een circumcisie ofwel besnijdenis wordt een gedeelte of de gehele voorhuid van de penis operatief verwijderd.

De meest voorkomende reden hiertoe is een te nauwe voorhuid. Gevolg hiervan kan zijn dat er moeilijkheden optreden bij plassen, pijn tijdens erectie en geslachtsgemeenschap of een ontsteking van de eikel of voorhuid.

Vorbereiding

Voor de operatie dient uw zoon(tje) nuchter te zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden in de anesthesiefolder die u bij de poli preoperatief heeft meegekregen.

Nazorginstructies na de ingreep

Als bij uw kind de operatie in dagverpleging geschiedt, kan hij dezelfde dag nog naar huis, meestal nadat hij geplast heeft. De dag na de operatie kunt u uw kind weer zijn gang laten gaan. De volgende dag mag uw kind weer douchen. Zo nodig, indien de eikel van de penis rood geïrriteerd is of schaafwondjes heeft (door het losmaken van verklevingen) is het aan te raden om te baden in lauwwarm water (zo nodig met biotex bij ontsteking), dit mag echter pas na drie tot vier dagen na de operatie in verband oplosbare hechtingen.

Hierdoor wordt de infectie rondom de hechtingen en het wondgebied voorkomen. Om de penis te ondersteunen en het wondgebied rust te geven zijn gewone onderbroeken het meest geschikt (geen boxershorts). Er zijn verder geen echte beperkingen.

Bij pijn mag u uw zoon(tje) drie tot vier maal daags een paracetamol tablet of zetpil geven. Afhankelijk van het herstel kan hij enkele dagen niet naar school. Het is beter dat hij de eerste twee weken niet sport of zwemt. Ons advies is om ongeveer tot 24 uur na de operatie de penis te verbinden, daarna hoeft er in principe niets meer omheen. Mocht ondanks het losweken onder de douche het verband moeizaam te verwijderen zijn, volgen hieronder nog enige tips:

Thuis geen verband, maar uw zoontje in z'n blote billen laten lopen.
Vettig gaas & steriel gaas los in de luier/onderbroek.

Complicaties

Basisregel van de wondbehandeling is schoon en droog houden van het wondgebied. Dus na douchen de wond droogdeppen. De mogelijke complicaties beperken zich bijna altijd tot de wond. Er kan een nabloeding optreden die zich kan uiten in een bloederig verband of een bloeditstorting onder een hechting. Soms treedt een wondgenezingsstoornis op in de vorm van infectie of abces. Indien de pijn steeds erger wordt, er pus of bloed uit de wond komt, de penis steeds dikker wordt of u koorts krijgt boven 38,5° C moet u contact opnemen met uw behandelend uroloog.

Wat te doen bij verhindering of ziekte?

Als u door ziekte of door andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Tot slot

Deze brochure betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding tot wijzigingen geven. Dit zal altijd door uw behandelend uroloog aan u kenbaar gemaakt worden. Als er bijzonderheden zijn waar u zich zorgen over maakt of nog vragen resteren, neemt u dan contact op met de polikliniek Urologie

Locatie Purmerend: (0299)457139

Bij klachten en acute problemen s 'avonds en in het weekend dan graag contact opnemen met de spoedeisende hulp (0299)457457

Locatie Hoorn: (0229)257826

Bij klachten en acute problemen s 'avonds en in het weekend dan graag contact opnemen met de spoedeisende hulp (0229)257257

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00901-NL 10-05-2022