



# Bronchoscopie onder sedatie

Longgeneeskunde

Locatie Hoorn/Enkhuizen

## **Bronchoscopie onder sedatie**

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een afspraak bij het scopiecentrum van het Dijklander Ziekenhuis te Hoorn

### **U wordt verwacht voor een bronchoscopie**

**Op:**----- dag

**Datum:** -----

**Opnametijd:** ----- uur

**Aanvang onderzoek:**-----uur

### **U meldt zich bij de informatiebalie in de centrale hal**

Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij de longarts met een bronchoscoop in uw luchtwegen (bronchiën) kijkt. Een bronchoscoop (= scoop) is een kijkinstrument, waarmee via een dunne buigzame slang en een lens de luchtwegen worden onderzocht. Bovendien kunnen via dit kijkinstrument zonnodig kleine stukjes weefsel worden weggenomen.

### **De opname**

De assistente heeft voor u een afspraak gemaakt voor de bronchoscopie.

Het feit dat de bronchoscopie onder sedatie plaatsvindt zorgt ervoor dat u op het scopiecentrum 6e etage opgenomen wordt. Op de afgesproken dag en tijd mag u zich melden bij de receptie van het ziekenhuis. U wordt dan door de gastvrouw naar het scopiecentrum gebracht. Hier worden controles gedaan zoals o.a. het meten van uw bloeddruk en pols.

## De voorbereiding

### Vertel uw arts als u:

- allergisch bent voor geneesmiddelen of verdooving;
- zwanger bent;
- bloedverdunnende middelen zoals Sintrommitis of Marcoumar gebruikt.

Voor het onderzoek mag u vanaf 24 uur 's nachts niet meer eten. Medicijnen mag u blijven gebruiken en tot 2 uur voor de **opnametijd** mag u **maximaal** 2 bekers water drinken. Als u inhalatiemedicatie gebruikt dan moet u deze op de dag van het onderzoek gebruiken.

Het is verstandig geen knellende kleding te dragen.

Indien u een gebitsprothese heeft, wordt u gevraagd deze uit te doen tijdens het onderzoek. Daarna verdooft de arts of de verpleegkundige uw keel en mond enkele malen met een verdoovingsspray. Dit is nodig om het kokhalsreflex weg te nemen. De verdoovingsspray heeft een bittere bananensmaak en geeft u een gevoelloze keel. Het slikken gaat nu moeilijker. Er wordt ook nog verdovingsvloeistof in de luchtwegen gedruppeld. Dit kan een hoestprikkel veroorzaken die na enkele seconden weer verdwijnt.

### Het onderzoek

Voor het onderzoek brengt de arts een infuusnaaldje in. Hierdoor wordt een vloeistof gespoten waardoor u in slaap valt en de bronchoscopie niet bewust mee zal maken.

### Wat gebeurt er tijdens het onderzoek

U zit in een stoel of ligt op een onderzoektafel. U kunt tijdens het onderzoek gewoon doorademen. Via een lampje aan het eind van de scoop kan de arts de binnenkant van de luchtpijp en de vertakkingen ervan bekijken. Soms wordt via dezelfde slang wat slijm weggezogen en/of een klein stukje weefsel (een biopt) weggenomen voor microscopisch onderzoek. Soms vindt de arts het noodzakelijk dat de luchtwegen worden gespoeld (lavage). Een water-zout oplossing wordt dan via de scoop ingespoten die meteen weer wordt afgezogen. Het afgezogen vocht en eventueel weggenomen stukje weefsel worden op het laboratorium onderzocht.

Het spoelen van de luchtwegen en het nemen van een biopt zijn pijnloos. Het onderzoek neemt tussen de 10 en 30 minuten in beslag.

## **De nazorg**

Als het onderzoek is afgelopen wordt u teruggebracht naar de uitslaapkamer van het scopiecentrum. Als u wakker bent, mag u in de loop van de ochtend met ontslag. Dit wordt door de verpleegkundige overlegd met de arts. Het is verstandig een begeleider mee te nemen. Het is belangrijk dat u tot 2 uur na het onderzoek niet eet en/of drinkt. De verdoving in de keel is dan nog niet uitgewerkt en u zou zich daardoor kunnen verslikken. Begin met een slokje water. Als u zich niet verslikt mag u weer alles hebben. Het kan zijn dat u een tijdje een geïrriteerd gevoel in uw keel hebt en wat moeilijk slikt.

Ook kan het zijn dat u na het onderzoek wat bloederig slijm ophoest. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken, het verdwijnt vanzelf weer, binnen 1 tot 2 dagen. Als uw luchtwegen gespoeld zijn (lavage) kan het zijn dat u 's avonds koorts krijgt, of een pijnlijk gevoel bij het ademen. Dit is een normaal verschijnsel. U kunt zondig een Paracetamol innemen. Als het de volgende dag nog niet over is, neem dan contact op met uw longarts. Als er stukjes weefsel via de bronchoscoop weggenomen worden, is er geringe kans op directe complicaties (zoals bloedingen) die in het algemeen niet ernstig zijn en vanzelf weer overgaan.

## **Tot slot**

Deze informatie is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u van uw arts heeft ontvangen. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig na te lezen. Heeft u nog vragen over dit onderzoek, schrijft u ze dan op en neem contact op met het scopiecentrum, telefoon 0229-257281.

Met algemene vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist, die ook de uitslag van het onderzoek aan u zal meedelen en bespreken.







**Locatie Enkhuizen**

Molenweg 9b  
1601 SR Enkhuizen  
T. 0228 312 345

**Locatie Hoorn**

Maelsonstraat 3  
1624 NP Hoorn  
T. 0229 257 257

**Locatie Purmerend**

Waterlandlaan 250  
1441 RN Purmerend  
T. 0299 457 457

**Locatie Volendam**

Heideweg 1b  
1132 DA Volendam  
T. 0229 257 500

**Postbus 600, 1620 AR Hoorn**

[www.dijklander.nl](http://www.dijklander.nl)  
[info@dijklander.nl](mailto:info@dijklander.nl)



FLD-00558-NL 09-12-2020