

Verliest u veel bloed als u ongesteld bent? Deze Consultkaart kan u en uw gynaecoloog helpen om uw mogelijkheden voor behandeling te bespreken. U kunt er ook voor kiezen om uw klachten niet te behandelen.

| BEHANDEL- MOGELIJKHEDEN ➔ | ANTICONCEPTIEPIL | HORMOONSPIRAALTJE | MEDICIJNEN ZONDER HORMONEN | BAARMOEDERSLIJMVLIES WEGHALEN (endometriumablatie) | BAARMOEDER WEGHALEN (hysterectomie) |
|--|---|---|--|--|--|
| Hoe werkt de behandeling? | U slikt elke dag de anticonceptiepil. | U laat een hormoonspiraaltje in uw baarmoeder plaatsen. Na vijf jaar moet het spiraaltje vervangen worden. | U slikt tranexaminezuur en/of NSAIDS (bijv. naproxen of ibuprofen) op de dagen dat uw ongesteldheid het ergst is. | <ul style="list-style-type: none"> - De gynaecoloog schroeft het baarmoederslijmvlies weg. - U krijgt hiervoor een plaatselijke verdoving of u gaat onder sedatie (oppervlakkig narcose) of diepe narcose. - U kunt dezelfde dag nog naar huis. - De herstelperiode is ongeveer 1 week. | <ul style="list-style-type: none"> - De gynaecoloog haalt de baarmoeder weg via de vagina, via een snee in de buik of met een kijkoperatie via de buik. - U gaat hiervoor onder narcose. - Na de behandeling moet u één, twee of drie nachten in het ziekenhuis blijven. Dit hangt af van de manier waarop de baarmoeder is weggehaald. - De herstelperiode is ongeveer 4-6 weken. |
| Hoe goed helpt het tegen het bloedverlies als u ongesteld bent? | Het bloedverlies vermindert gemiddeld met 50%. | Het bloedverlies vermindert gemiddeld met 90%. | <ul style="list-style-type: none"> - Tranexaminezuur vermindert het bloedverlies gemiddeld met 50%. - NSAIDS vermindert het bloedverlies gemiddeld met 20 tot 30%. | <ul style="list-style-type: none"> - 85 van de 100 vrouwen (85%) heeft minder of geen bloedverlies meer. - 40 van de 100 vrouwen (40%) verliest helemaal geen bloed meer. | U wordt niet meer ongesteld na deze operatie. |
| Wat zijn de mogelijke bijwerkingen of risico's? | <ul style="list-style-type: none"> - Hoofdpijn - Wisselingen in emoties - Zwaarder worden - Bloed verliezen als u het niet verwacht - Helemaal geen bloed meer verliezen - Last van uw maag en darmen - Licht verhoogde kans op trombose | <ul style="list-style-type: none"> - Hoofdpijn - Wisselingen in emoties - Zwaarder worden - Bloed verliezen als u het niet verwacht - Helemaal geen bloed meer verliezen | <ul style="list-style-type: none"> - Last van uw maag en darmen. - Door NSAIDS heeft u meer kans dat u maagzweren krijgt of maagbloedingen. | <ul style="list-style-type: none"> - Veel vrouwen hebben een paar weken waterige afscheiding. - 2 van de 100 vrouwen (2%) krijgt een complicatie, zoals trombose, een infectie of een nabloeding. - Hierdoor kunt u tijdelijk meer bloed verliezen, koorts of pijn hebben. U moet soms aanvullende medicatie slikken en het herstel kan vertraagd worden. | <ul style="list-style-type: none"> - 5 van de 100 vrouwen (5%) krijgt een complicatie, zoals trombose, een infectie, schade aan een orgaan of een nabloeding. - Hierdoor kunt u tijdelijk meer bloed verliezen, koorts of pijn hebben. U moet soms aanvullende medicatie slikken en het herstel kan vertraagd worden. |
| Heeft u minder pijn als u ongesteld bent? | Vaak wel. | Vaak wel. | <ul style="list-style-type: none"> - Als u tranexaminezuur neemt, blijft de pijn hetzelfde. - Als u NSAIDS neemt, wordt de pijn vaak minder. | Dit weten we niet. Bij een aantal vrouwen wordt de pijn juist erger. | U wordt niet meer ongesteld. Menstruatiepijn is meestal verdwenen, overige buikpijn is niet altijd weg. |
| Heeft de behandeling invloed op mijn kans om zwanger te worden? | Ja, de kans dat u zwanger wordt is heel klein. Wilt u op een later moment graag zwanger worden? Dan kunt u op dat moment stoppen met het gebruiken van de anticonceptiepil. | Ja, de kans dat u zwanger wordt is heel klein. Wilt u op een later moment graag zwanger worden? Dan kunt u op dat moment het spiraaltje laten verwijderen. | Nee. U moet wel stoppen met de medicijnen als u zwanger bent. | Ja, de kans om zwanger te worden, is sterk verminderd. U kunt nog wel zwanger worden, maar die zwangerschap kan ernstige gevolgen hebben. Anticonceptie wordt aangeraden. | Ja, u kunt niet meer zwanger worden na deze behandeling. |