Gastroscopie

Scopiecentrum/Maag Darm Lever

DIJKLANDER ZIEKENHUIS

Gastroscopie

Op verzoek van uw behandelend arts hebben wij een afspraak voor u gemaakt.

U wordt verwacht voor een gastroscopie

Op:_____ dag

Datum: _____

Om: _____ uur

Onderzoektijd _____ uur

Voor locatie **Hoorn** mag u zich *melden bij de balie* van het scopiecentrum op de **6e etage met lift R.**
U heeft **geen** afsprakenticket nodig.

Voor locatie **Purmerend** mag u zich *melden bij de balie* van het scopiecentrum op de **1e etage, route 75A**.
U heeft een afsprakenticket nodig.

Wat is een gastroscopie:

Bij een gastroscopie bekijkt de arts via de mond het slijmvlies van de slokdarm, de maag en het eerste deel van de twaalfvingerige darm, direct voorbij de maag. Dit is mogelijk met de gastroscoop, een flexibele slang met een doorsnee van één centimeter met aan het eind een videocamera.

Een gastroscopie kan alleen goed uitgevoerd worden, wanneer de maag leeg is.

Voorbereiding
ochtend

Op de avond voor het onderzoek:

- **Tot** 24.00 uur 's nachts mag u nog eten en drinken.
- **Vanaf** 24.00 uur 's nachts mag u tot 2 uur voor het onderzoek **maximaal** 2 bekers water drinken, niet meer eten.

Voorbereiding
middag

Op de dag van het onderzoek:

- 06.00 uur in de ochtend, licht ontbijt,
  1 sneetje witbrood of beschuit met jam zonder boter en 1 kop thee zonder suiker en zonder melk.
  Geen vette maaltijd zoals pap, vla en yoghurt.
- U mag gedurende de dag nog **maximaal** 2 bekers water drinken tot 2 uur voor het onderzoek.

U dient voor het onderzoek:
geen lippenstift of tongpiercing te dragen
geen kauwgom in de mond te hebben.

Op de scopiekamer moet u een eventuele gebitsprothese of plaatje verwijderen.
Als u een gebittenbakje heeft neemt u deze dan mee.

Tijdens het onderzoek is het niet toegestaan dat er begeleiding of familie op de scopiekamer aanwezig is.

Het onderzoek:

Vooraf aan het onderzoek volgen er nog enkele standaardcontroles. Deze standaardcontrole heet de “time-out procedure”.
Bent u de juiste patiënt en klopt het onderzoek met de afspraak? Om daar zeker van te zijn, stellen wij u een aantal vragen: uw naam, geboortedatum, het soort onderzoek en of u ergens allergisch voor bent.

Om een kokhalsreflex te voorkomen of te verminderen wordt uw keel verdoofd met een keelspray.
U mag na het onderzoek een half uur niets eten of drinken.

Op de scopiekamer krijgt u een drankje te drinken tegen schuimvorming in de maag . U moet op uw linkerzijde op de behandeltafel gaan liggen. Om de gastroscoop te beschermen wordt een bijtring in uw mond geplaatst. Door deze bijtring gaat de gastroscoop de keel in. De arts verzoekt u dan te slikken. Hierdoor komt de gastroscoop gemakkelijk in de slokdarm terecht. Vanaf dit moment wordt de gastroscoop door de arts bestuurd. Door via de gastroscoop lucht in te blazen, ontplooien slokdarm, maag en twaalfvingerige darm zich en zijn zo beter te bekijken. Hierdoor ontstaat vaak een opgezet gevoel in de bovenbuik. Een ander gevolg is, dat u last krijgt van opboeren. Het is geen pijnlijk onderzoek.

Het onderzoek duurt gemiddeld tien minuten. Indien nodig neemt de arts tijdens het onderzoek stukjes weefsel weg (biopten). Dit materiaal gaat voor onderzoek naar het laboratorium. Van het nemen van deze biopten merkt u niets.

Medicijnen:

Als u **maagzuurremmers** gebruikt (omeprazol, losec, pantozol, nexium, prezal, rantidine, cimetidine), kunt u deze blijven gebruiken tenzij in het voorgesprek anders is besproken. Op de dag van het onderzoek de maagzuurremmers pas **na** het onderzoek innemen!

Gebruikt u **ijzertabletten** dan is het noodzakelijk dat u hiermee **stopt** vanaf **zeven dagen** voor het onderzoek.

Overleg met uw behandelend arts of u met bepaalde medicijnen moet stoppen. Dit geldt voornamelijk voor de bloedverdunnende medicatie. Het gebruik van deze middelen tijdens het ondergaan van een gastroscopie, kan bij een ingreep langdurige bloedingen veroorzaken. Bloeddruk- en hartmedicatie en medicatie tegen epilepsie kunt u 's morgens met een slok water innemen.

Diabetes:

Heeft u diabetes en gebruikt u tabletten of insuline, neemt u hierover contact op met uw (huis)arts of diabetesverpleegkundige. Indien u insuline gebruikt controleer dan vóór dat u naar het ziekenhuis vertrekt uw bloedsuiker. Het is ook aan te raden uw insulinepen, bloedsuikermeter en een boterham mee te nemen voor na het onderzoek.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgevoegde folder.

Mogelijke risico's en complicaties:

Hoewel een gastroscopie over het algemeen een veilig onderzoek is, kunnen er in enkel geval complicaties optreden.
Wanneer er nog voedsel in de maag aanwezig is, kan u zich tijdens de gastroscopie hier in verslikken. Als het voedsel in de luchtpijp komt, kan er een longontsteking optreden. Dit gebeurt vaker na het toedienen van keelverdoving of kalmeringsmiddelen. Krachtig opboeren tijdens het onderzoek kan een beschadiging in het laatste gedeelte van de slokdarm veroorzaken met een lichte bloeding tot gevolg. Wanneer de gastroscoop moeizaam de keel passeert of wanneer er vernauwingen zijn, kan er een scheurtje ontstaan. Deze complicaties komen niet vaak voor en zijn niet ernstig. Ze zijn meteen door de arts zichtbaar en direct te behandelen.

Na afloop kunt u een wat rauw gevoel in de keel ervaren, dit gevoel verdwijnt doorgaans vrij snel.

Nazorg en uitslag:

U krijgt de uitslag van het onderzoek van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.
Wanneer u **binnen 24** uur na scopie ernstige klachten (b.v. bloedbraken of koorts) krijgt, moet direct contact worden opgenomen met de arts die het onderzoek verricht heeft.

Binnen kantooruren neemt u contact op met het scopiecentrum Hoorn, 0229-257281.

Buiten kantooruren kan men via de receptie van het ziekenhuis contact opnemen met de spoedeisende hulp van locatie Hoorn, 0229-257257.

Is het onderzoek **langer dan 24 uur** geleden dan mag u contact opnemen met uw huisarts als u klachten heeft. Uw huisarts beoordeeld dan of er contact opgenomen moet worden met het ziekenhuis.

Wachttijd:

Uiteraard proberen wij u op het afgesproken tijdstip te helpen. Soms kan het gebeuren dat u toch langer moet wachten, door bijvoorbeeld een spoedingreep of onvoorziene omstandigheden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Bereikbaarheid

locatie Hoorn:

Met de auto via de provinciale weg (N506), u volgt de borden Dijklander Ziekenhuis.
Bij het ziekenhuis is een parkeergarage waarvoor moet worden betaald (dagkaart).
Het scopiecentrum bevindt zich op de **6e etage, lift R.**

Locatie Purmerend:

Bij het ziekenhuis is een parkeerplaats aan de voorzijde en aan de achterzijde van het ziekenhuis waarvoor moet worden betaald.
Het scopiecentrum bevindt zich op de **1e etage, route 75**

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.30 uur.

Telefonisch bereikbaar: 0229-257281 tot 17.00 uur.

Maag Darm Leverartsen werkzaam in het Dijklander Ziekenhuis

Dhr. drs.A.A. Karimbeg
Dhr. dr. J. Schmidt
Dhr. dr. E. Schnekenburger
Mw. drs. M.S.Vlug
Dhr. dr. X.G. Vos
Dhr. dr. S. Balkema
Mw. dr. M.S.G. Sikkens
Dhr. dr. F.W.J. te Braake
Mw. M.G.F. van Lier
Dhr. P.W. Weijenborg
Dhr. G. Nibourg

Verpleegkundig endoscopist

Mw. L. Kleimeer-Jansen
Mw. K. van der Vliet
Mw. C. Taam
Mw. P. Heemskerk

Als u nog vragen heeft, stelt u ze dan gerust aan uw arts of aan de verpleegkundige van het scopiecentrum of kijk op onze website: www.dijklander.nl

Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn
Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl

FLD-00119-NL 27-06-2023

DIJKLANDER ZIEKENHUIS